

## Grundlagen der Mathematik I – 5. Tutoriumsblatt

**Aufgabe 1 (Ein Körper mit zwei Elementen).** Auf der Menge  $K = \{\bar{0}, \bar{1}\}$  mit den Elementen  $\bar{0} \neq \bar{1}$  wird eine Addition  $+$  sowie eine Multiplikation  $\cdot$  definiert durch Angabe der Verknüpfungstabellen

$$\begin{array}{c|cc} + & \bar{0} & \bar{1} \\ \hline \bar{0} & \bar{0} & \bar{1} \\ \bar{1} & \bar{1} & \bar{0} \end{array} \quad \text{und} \quad \begin{array}{c|cc} \cdot & \bar{0} & \bar{1} \\ \hline \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} \\ \bar{1} & \bar{0} & \bar{1} \end{array}$$

definiert. Man zeige, daß  $(K, +, \cdot)$  ein Körper mit Nullelement  $\bar{0}$  und Einselement  $\bar{1}$  ist.

Bemerkung: Die Querstriche über  $\bar{0}$  und  $\bar{1}$  haben bislang keine eigene Bedeutung; sie sind als Teil des *Namens* der Elemente zu sehen. Manche Mathematiker schreiben auch einfach 0 statt  $\bar{0}$  und 1 statt  $\bar{1}$ ; unsere Schreibweise betont, daß es sich *nicht* um die natürlichen Zahlen „Null“ und „Eins“ handelt.

**Aufgabe 2 (Lösen von Gleichungen).** Man bestimme die Elemente der Menge

$$L = \left\{ x \in [-2, 7] \mid \sqrt{5x+10} - \sqrt{7-x} = 3 \right\}.$$

Dabei dürfen Schulkenntnisse über die Definition von und das Rechnen mit Wurzeln verwendet werden.

**Aufgabe 3 (Ein weiterer Körper I).** Für den Körper  $(\mathbb{R}, +, \cdot)$  betrachte man die Teilmenge  $K := \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ .

- Man berechne die Summe und das Produkt von  $x = a + b\sqrt{2}$  und  $y = c + d\sqrt{2}$  mit  $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$ .
- Man zeige, daß mit  $x$  und  $y$  auch  $x + y$ ,  $x \cdot y$  sowie  $-x$  in  $K$  liegen.

Bemerkung: De facto ist  $(K, +, \cdot)$  ein Körper; siehe Aufgabe 3 vom 5. Übungsblatt.

**Aufgabe 4 (Ungleichungen).** Sei  $(K, +, \cdot, <)$  ein angeordneter Körper. Man beweise oder widerlege:

- Es ist stets  $0 < 1$  (wobei 0 das Null- und 1 das Einselement von  $K$  bezeichnet).
- Für alle  $a, b \in K$  mit  $a < b$  gilt  $a < \frac{a+b}{2} < b$ .
- Für alle  $a, b \in K$  mit  $a < b$  gilt  $a^2 < a \cdot b < b^2$ .