

## Tutorium zur Vorlesung „Differential- und Integralrechnung I“ — Bearbeitungsvorschlag —

29. In Abhängigkeit von den reellen Parametern  $a, b > 0$  mit  $b \neq 1$  ist die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n \quad \text{mit} \quad c_n = \frac{a^n}{1-b^n} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}$$

zu betrachten; dabei ist

$$\left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \left| \frac{a^{n+1}}{1-b^{n+1}} \cdot \frac{1-b^n}{a^n} \right| = \left| \frac{a^{n+1}}{a^n} \cdot \frac{1-b^n}{1-b^{n+1}} \right| \stackrel{a>0}{=} a \cdot \left| \frac{1-b^n}{1-b^{n+1}} \right|$$

für alle  $n \in \mathbb{N}$ . Dies motiviert die folgende Fallunterscheidung:

- Fall 1:  $0 < b < 1$ . Damit ist  $\lim_{n \rightarrow \infty} b^n = 0$  sowie  $\lim_{n \rightarrow \infty} b^{n+1} = 0$ , woraus sich

$$\left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = a \cdot \left| \frac{1-b^n}{1-b^{n+1}} \right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a \cdot \left| \frac{1-0}{1-0} \right| = a$$

ergibt; nach dem Quotientenkriterium ist also die Reihe  $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$  für  $0 < a < 1$  konvergent sowie für  $a > 1$  divergent. Für  $a = 1$  ist die Folge  $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$  gemäß

$$c_n = \frac{a^n}{1-b^n} = \frac{1^n}{1-b^n} = \frac{1}{1-b^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1-0} = 1$$

keine Nullfolge und damit insbesondere die Reihe  $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$  divergent.

- Fall 2:  $b > 1$ . Damit ist  $0 < \frac{1}{b} < 1$  mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{b}\right)^n = 0$ , woraus sich

$$\begin{aligned} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| &= a \cdot \left| \frac{1-b^n}{1-b^{n+1}} \right| = a \cdot \left| \frac{b^n \cdot \left(\frac{1}{b^n} - 1\right)}{b^n \cdot \left(\frac{1}{b^n} - b\right)} \right| = \\ &= a \cdot \left| \frac{\left(\frac{1}{b}\right)^n - 1}{\left(\frac{1}{b}\right)^n - b} \right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a \cdot \left| \frac{0-1}{0-b} \right| = a \cdot \frac{1}{b} = \frac{a}{b} \end{aligned}$$

ergibt; nach dem Quotientenkriterium ist also die Reihe  $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$  für  $\frac{a}{b} < 1$ , also für  $a < b$ , konvergent sowie für  $\frac{a}{b} > 1$ , also für  $a > b$ , divergent. Für  $\frac{a}{b} = 1$ , also für  $a = b$  ist die Folge  $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$  gemäß

$$c_n = \frac{a^n}{1-b^n} = \frac{b^n}{1-b^n} = \frac{b^n}{b^n \cdot \left(\frac{1}{b^n} - 1\right)} = \frac{1}{\left(\frac{1}{b}\right)^n - 1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{0-1} = -1$$

keine Nullfolge und damit insbesondere die Reihe  $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$  divergent.

30. Für die zu betrachtende Reihe  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  gilt

$$a_n = \frac{1 + 2^n x^{2n}}{1 + n^2} = \frac{1}{1 + n^2} + \frac{2^n x^{2n}}{1 + n^2},$$

also

$$a_n = b_n + c_n \quad \text{mit} \quad b_n = \frac{1}{1 + n^2} \quad \text{und} \quad c_n = \frac{2^n x^{2n}}{1 + n^2}$$

für alle  $n \in \mathbb{N}$ . Wegen

$$|b_n| = \frac{1}{1 + n^2} \leq \frac{1}{n^2}$$

für alle  $n \in \mathbb{N}$  besitzt die Reihe  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  die konvergente Majorante  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  und ist daher nach dem Majorantenkriterium selbst konvergent; folglich konvergiert nun die Reihe  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  genau dann, wenn die Reihe  $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$  konvergiert.

Für  $x = 0$  ist  $c_n = 0$  für alle  $n \in \mathbb{N}$  und damit die Reihe  $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$  konvergent, und für  $x \neq 0$  ergibt sich

$$\begin{aligned} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| &= \left| \frac{2^{n+1} x^{2(n+1)}}{1 + (n+1)^2} \cdot \frac{1 + n^2}{2^n x^{2n}} \right| = \left| \frac{2^{n+1}}{2^n} \cdot \frac{x^{2n+2}}{x^{2n}} \cdot \frac{1 + n^2}{1 + (n+1)^2} \right| = \\ &= \left| 2 \cdot x^2 \cdot \frac{\frac{1}{n^2} + 1}{\frac{1}{n^2} + (1 + \frac{1}{n})^2} \right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 2 \cdot x^2 \cdot \frac{0 + 1}{0 + (1 + 0)^2} = 2x^2; \end{aligned}$$

damit ist die Reihe  $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$  nach dem Quotientenkriterium

- für alle  $x \in \mathbb{R}$  mit  $2x^2 < 1$  (absolut) konvergent, wegen

$$2x^2 < 1 \iff x^2 < \frac{1}{2} \iff |x| < \frac{1}{\sqrt{2}} \iff -\frac{1}{\sqrt{2}} < x < \frac{1}{\sqrt{2}}$$

also für alle  $x \in ]-\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}[$ , sowie

- für alle  $x \in \mathbb{R}$  mit  $2x^2 > 1$  divergent, wegen

$$2x^2 > 1 \iff x^2 > \frac{1}{2} \iff |x| > \frac{1}{\sqrt{2}} \iff x < -\frac{1}{\sqrt{2}} \text{ oder } \frac{1}{\sqrt{2}} < x$$

also für alle  $x \in ]-\infty; -\frac{1}{\sqrt{2}}[ \cup ]\frac{1}{\sqrt{2}}; \infty[$ .

Für die verbleibenden Fälle  $2x^2 = 1$ , also  $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ , ergibt sich

$$c_n = \frac{2^n x^{2n}}{1+n^2} = \frac{(2x^2)^n}{1+n^2} = \frac{1^n}{1+n^2} = \frac{1}{1+n^2} = b_n$$

für alle  $n \in \mathbb{N}$ ; damit ist die Reihe  $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$  konvergent.

Zusammenfassend ist die Reihe  $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$  und damit die gegebene Reihe  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  genau

dann konvergent, wenn  $x \in \left[-\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}\right]$  gilt.

31. a) Eine gebrochenrationale Funktion ist auf ganz  $\mathbb{R}$  mit Ausnahme der Nullstellen des Nenners definiert; wegen  $x-1=0 \iff x=1$  und  $x^2=1 \iff x=\pm 1$  ist also  $D = \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$ .

b) Für alle  $x \in D$  gilt

$$f(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{2}{x^2-1} = \frac{(x+1)-2}{x^2-1} = \frac{x-1}{x^2-1} = \frac{1}{x+1};$$


Damit ergibt sich

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x+1} = 0 \quad \text{und} \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{2}$$

sowie

$$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1-} \frac{1}{x+1} = -\infty \quad \text{und} \quad \lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1+} \frac{1}{x+1} = \infty$$

- c) Unter Berücksichtigung der in a) und b) erzielten Ergebnisse ergibt sich für den Graphen  $G_f$  der Funktion  $f$  damit:



32. a) Für alle  $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$  gilt

$$f(x) = \frac{1 + 2x + 3x^2}{x^2 + x + 1} = \frac{x^2 \left( \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x} + 3 \right)}{x^2 \left( 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right)} = \frac{\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x} + 3}{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}$$

sowie

$$g(x) = \frac{(x^3 + 1)^2}{(x^2 + 1)^3} = \frac{\left( x^3 \left( 1 + \frac{1}{x^3} \right) \right)^2}{\left( x^2 \left( 1 + \frac{1}{x^2} \right) \right)^3} = \frac{x^6 \left( 1 + \frac{1}{x^3} \right)^2}{x^6 \left( 1 + \frac{1}{x^2} \right)^3} = \frac{\left( 1 + \frac{1}{x^3} \right)^2}{\left( 1 + \frac{1}{x^2} \right)^3}.$$

Damit gilt

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x} + 3}{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} = \frac{0 + 0 + 3}{1 + 0 + 0} = 3$$

sowie

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\left( 1 + \frac{1}{x^3} \right)^2}{\left( 1 + \frac{1}{x^2} \right)^3} = \frac{(1 + 0)^2}{(1 + 0)^3} = 1.$$

b) Für alle  $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$  gilt

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 \left( 1 + \frac{1}{x^2} \right)}} = \frac{x}{|x| \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}}$$

und damit (wegen der Stetigkeit der Quadratwurzel)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{|x| \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 0}} = 1$$

sowie

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{|x| \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} = \frac{-1}{\sqrt{1 + 0}} = -1.$$

Für alle  $x \in \mathbb{R}$  gilt

$$\begin{aligned} g(x) &= x - \sqrt{x^2 + 1} = \frac{(x - \sqrt{x^2 + 1})(x + \sqrt{x^2 + 1})}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = \\ &= \frac{x^2 - \sqrt{x^2 + 1}^2}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x^2 - (x^2 + 1)}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = \frac{-1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \end{aligned}$$

und damit

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = 0;$$

ferner ergibt sich

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left( \underbrace{x}_{\rightarrow -\infty} - \underbrace{\sqrt{x^2 + 1}}_{\rightarrow \infty} \right) = -\infty.$$