Dr. Erwin Schörner

Klausurenkurs zum Staatsexamen (SS 2020): Differential- und Integralrechnung 7 — Lösungsvorschlag —

7.1 Das gegebene Dreieck

$$\Delta = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x, 0 \leq y, x + y \leq 3\}$$

wird von den Geraden $x = 0$, $y = 0$ und $x + y = 3$ begrenzt und besitzt damit die Eckpunkte $(0, 0)$, $(3, 0)$ und $(0, 3)$; es ist insbesondere eine kompakte und zusammenhängende Teilmenge von $\mathbb{R}^2$. Die gegebene Funktion

$$f : \Delta \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = (3 - (x + y)) e^x y^2,$$

ist (als Produkt von Polynomfunktionen und der Exponentialfunktion) insbesondere stetig und besitzt daher auf dem Kompaktum $\Delta \subseteq \mathbb{R}^2$ nach dem Satz von Weierstraß mindestens eine globale Minimalstelle $(a, b) \in \Delta$ und mindestens eine globale Maximalstelle $(c, d) \in \Delta$ mit

$$f(a, b) \leq f(x, y) \leq f(c, d) \quad \text{für alle } (x, y) \in \Delta;$$

da $\Delta \subseteq \mathbb{R}^2$ zudem zusammenhängend ist, gilt für den Wertebereich

$$f(\Delta) = [f(a, b), f(c, d)].$$

Dabei gilt für alle $(x, y) \in \Delta$ zunächst

$$f(x, y) = \underbrace{(3 - (x + y))}_{\geq 0} \cdot \underbrace{e^x}_{> 0} \cdot \underbrace{y^2}_{\geq 0} \geq 0$$

mit

$$f(x, y) = 0 \iff x + y = 3 \quad \text{oder} \quad y = 0;$$

folglich nimmt die Funktion f genau in den Punkten $(a, b) \in \Delta$ auf den beiden Dreiecksseiten mit den Ecken $(3, 0)$ und $(0, 3)$ bzw. $(0, 0)$ und $(3, 0)$ ihr globales Minimum $f(a, b) = 0$ an. Für eine globale Maximalstelle $(c, d) \in \Delta$ gibt es nun die folgenden beiden Möglichkeiten:

- Der Punkt (c, d) liegt ebenfalls auf dem Rand von Δ und damit auf der offenen Dreiecksseite mit den Ecken $(0, 0)$ und $(0, 3)$; er besitzt daher die Gestalt $(0, t)$ für ein $t \in]0, 3[$ mit

$$f(0, t) = (3 - (0 + t)) e^0 t^2 = (3 - t) t^2 = 3t^2 - t^3.$$

Da die (als Polynomfunktion) differenzierbare Hilfsfunktion

$$h :]0, 3[\rightarrow \mathbb{R}, \quad h(t) = 3t^2 - t^3$$

auf dem offenen Intervall $]0, 3[$ ihre Extremwerte nur in den Nullstellen ihrer Ableitung h' mit

$$h'(t) = 6t - 3t^2 = 3t(2 - t) \quad \text{für alle } t \in]0, 3[,$$

also in $t = 2$ annehmen kann, kommt für (c, d) nur der Punkt $(0, 2)$ in Frage.

- Der Punkt (c, d) liegt im Innern $\overset{\circ}{\Delta}$ von Δ mit

$$\overset{\circ}{\Delta} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x, 0 < y, x + y < 3\};$$

da f (als Produkt von Polynomfunktionen und der Exponentialfunktion) insbesondere partiell differenzierbar ist, kommen hierfür nur die kritischen Stellen von f , also die Nullstellen von $\text{grad } f$ in Frage. Wegen

$$\partial_x f(x, y) = (-1) \cdot e^x \cdot y^2 + (3 - (x + y)) \cdot e^x \cdot y^2 = (2 - (x + y)) \cdot e^x \cdot y^2$$

und

$$\partial_y f(x, y) = (-1) \cdot e^x \cdot y^2 + (3 - (x + y)) \cdot e^x \cdot 2y$$

für alle $(x, y) \in \overset{\circ}{\Delta}$ folgt aus $\text{grad } f(c, d) = (0, 0)$ zum einen

$$\partial_x f(c, d) = (2 - (c + d)) \cdot \underbrace{e^c}_{>0} \cdot \underbrace{d^2}_{>0} = 0, \quad \text{also} \quad c + d = 2,$$

und damit zum anderen

$$\begin{aligned} \partial_y f(c, d) &= (-1) \cdot e^c \cdot d^2 + \underbrace{(3 - (c + d))}_{=3-2=1} \cdot e^c \cdot 2d \\ &= e^c \cdot (-d^2 + 2d) = \underbrace{e^c}_{>0} \cdot \underbrace{d}_{>0} \cdot (2 - d) = 0, \end{aligned}$$

also $d = 2$ und damit $c = 0$; damit liegt aber (c, d) nicht im Innern von Δ .

Folglich nimmt die Funktion f im Punkt $(c, d) = (0, 2)$ ihr globales Maximum

$$f(c, d) = f(0, 2) = f(x, y) = (3 - (0 + 2)) \cdot e^0 \cdot 2^2 = 1 \cdot 1 \cdot 4 = 4$$

an, und wir erhalten $f(\Delta) = [f(a, b), f(c, d)] = [0, 4]$.

7.2 Die gegebene Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = e^{-x^2 - y^2 - 5} (x^2 + y^2)^2,$$

ist (als Produkt und Verkettung von Polynomfunktionen und der Exponentialfunktion) partiell differenzierbar, und für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ gilt

$$\begin{aligned} \partial_x f(x, y) &= \left(e^{-x^2 - y^2 - 5} \cdot (-2x) \right) \cdot (x^2 + y^2)^2 + e^{-x^2 - y^2 - 5} \cdot (2(x^2 + y^2)) \cdot (2x) \\ &= -2x e^{-x^2 - y^2 - 5} (x^2 + y^2) \cdot (x^2 + y^2 - 2) \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}\partial_y f(x, y) &= \left(e^{-x^2-y^2-5} \cdot (-2y) \right) \cdot (x^2 + y^2)^2 + e^{-x^2-y^2-5} \cdot (2(x^2 + y^2) \cdot (2y)) \\ &= -2y e^{-x^2-y^2-5} (x^2 + y^2) \cdot (x^2 + y^2 - 2).\end{aligned}$$

Die kritischen Punkte $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ von f sind genau die Nullstellen des Gradienten $\text{grad } f$ von f , wegen

$$\begin{aligned}\partial_x f(x, y) = 0 &\iff -2x \cdot \underbrace{e^{-x^2-y^2-5}}_{>0} \cdot (x^2 + y^2) \cdot (x^2 + y^2 - 2) \\ &\iff x = 0 \quad \text{oder} \quad x^2 + y^2 = 0 \quad \text{oder} \quad x^2 + y^2 - 2 = 0 \\ &\iff x = 0 \quad \text{oder} \quad x^2 + y^2 = 2\end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}\partial_y f(x, y) = 0 &\iff -2y \cdot \underbrace{e^{-x^2-y^2-5}}_{>0} \cdot (x^2 + y^2) \cdot (x^2 + y^2 - 2) \\ &\iff y = 0 \quad \text{oder} \quad x^2 + y^2 = 0 \quad \text{oder} \quad x^2 + y^2 - 2 = 0 \\ &\iff y = 0 \quad \text{oder} \quad x^2 + y^2 = 2,\end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned}\text{grad } f(x, y) = (0, 0) &\iff (\partial_x f(x, y) = 0 \quad \text{und} \quad \partial_y f(x, y) = 0) \iff \\ &(x = 0 \quad \text{oder} \quad x^2 + y^2 = 2) \quad \text{und} \quad (y = 0 \quad \text{oder} \quad x^2 + y^2 = 2) \iff \\ &\iff (x = 0 \quad \text{und} \quad y = 0) \quad \text{oder} \quad x^2 + y^2 = 2,\end{aligned}$$

sind dies genau der Ursprung $(0, 0)$ sowie die Punkte der Kreislinie $x^2 + y^2 = 2$ mit dem Mittelpunkt $(0, 0)$ und dem Radius $\sqrt{2}$. Wegen

$$f(x, y) = \underbrace{e^{-x^2-y^2-5}}_{>0} \cdot \underbrace{(x^2 + y^2)^2}_{\geq 0} \geq 0 = f(0, 0)$$

für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ nimmt die Funktion f in $(0, 0)$ ihr globales (und damit auch ein lokales) Minimum an. Des weiteren betrachten wir für die Punkte $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ die Darstellung in Polarkoordinaten $x = r \cos \varphi$ und $y = r \sin \varphi$ mit $r \in \mathbb{R}_0^+$ und $\varphi \in [0, 2\pi]$, und wegen

$$x^2 + y^2 = (r \cos \varphi)^2 + (r \sin \varphi)^2 = r^2 \underbrace{(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi)}_{=1} = r^2$$

ergibt sich

$$f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)-5} (x^2 + y^2)^2 = e^{-r^2-5} (r^2)^2 = e^{-r^2-5} r^4.$$

Die Hilfsfunktion

$$h : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(r) = e^{-r^2-5} \cdot r^4,$$

ist (als Produkt und Verkettung von Polynomfunktionen und der Exponentialfunktion) differenzierbar, und für alle $r > 0$ gilt

$$h'(r) = \left(e^{-r^2-5} \cdot (-2r) \right) \cdot r^4 + e^{-r^2-5} \cdot 4r^3 = -2 \cdot \underbrace{e^{-r^2-5}}_{>0} \cdot \underbrace{r^3}_{>0} \cdot (r^2 - 2);$$

es ergibt sich demnach:

- für alle $r \in]0, \sqrt{2}[$ gilt $r^2 < 2$ und damit

$$h'(r) = \underbrace{-2 \cdot e^{-r^2-5} \cdot r^3}_{<0} \cdot \underbrace{(r^2 - 2)}_{<0} > 0,$$

so daß die stetige Funktion h auf $[0, \sqrt{2}]$ streng monoton wächst,

- für alle $r \in]\sqrt{2}, +\infty[$ gilt $r^2 > 2$ und damit

$$h'(r) = \underbrace{-2 \cdot e^{-r^2-5} \cdot r^3}_{<0} \cdot \underbrace{(r^2 - 2)}_{>0} < 0,$$

so daß die stetige Funktion h auf $[\sqrt{2}, +\infty[$ streng monoton fällt.

Folglich ist $\sqrt{2}$ eine globale Maximalstelle von h , und wir erhalten

$$f(x, y) = h(r) \leq h(\sqrt{2}) \quad \text{für alle } (x, y) \in \mathbb{R}^2;$$

da aber $h(\sqrt{2})$ der gemeinsame Funktionswert aller Punkte auf der Kreislinie um $(0, 0)$ mit Radius $\sqrt{2}$ unter der Funktion f ist, nimmt diese dort ihr globales Maximum (und damit auch lokale Maxima) an.

7.3 a) Die gegebene Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = (x + y)^2 - \cos x,$$

ist (als Differenz einer quadratischen Funktion und des Cosinus) zweimal stetig partiell differenzierbar, und für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ gilt

$$\partial_x f(x, y) = 2(x + y) + \sin x \quad \text{und} \quad \partial_y f(x, y) = 2(x + y),$$

also

$$\text{grad } f(x, y) = (2(x + y) + \sin x, 2(x + y)),$$

sowie

$$\partial_x \partial_x f(x, y) = 2 + \cos x \quad \text{und} \quad \partial_y \partial_y f(x, y) = 2$$

und

$$\partial_x \partial_y f(x, y) = 2 = \partial_y \partial_x f(x, y),$$

also

$$\text{Hess } f(x, y) = \begin{pmatrix} 2 + \cos x & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Die kritischen Punkte von f sind definitionsgemäß genau die Nullstellen von $\text{grad } f$, und für $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ gilt dabei

$$\begin{aligned} \text{grad } f(x, y) = (0, 0) &\iff (2(x + y) + \sin x, 2(x + y)) = (0, 0) \\ &\iff 2(x + y) + \sin x = 0 \quad \text{und} \quad 2(x + y) = 0 \\ &\iff \sin x = 0 \quad \text{und} \quad x + y = 0 \\ &\iff x \in \mathbb{Z} \cdot \pi \quad \text{und} \quad y = -x \\ &\iff (x, y) = (k\pi, -k\pi) \quad \text{für ein } k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Um den Typ des kritischen Punktes $(k\pi, -k\pi)$ für ein $k \in \mathbb{Z}$ der Funktion f zu ermitteln, betrachten wir

$$H_k = \text{Hess } f(k\pi, -k\pi) = \begin{pmatrix} 2 + \cos(k\pi) & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + (-1)^k & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix};$$

dadurch wird die folgende Fallunterscheidung motiviert:

- Ist $k \in \mathbb{Z}$ gerade, so ergibt sich wegen $(-1)^k = 1$ dann

$$H_k = \begin{pmatrix} 2 + (-1)^k & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix};$$

wegen $\det H_k = 2 > 0$ und $\text{Spur } H_k = 5 > 0$ ist H_k positiv definit, so daß f in $(k\pi, -k\pi)$ ein (isoliertes) lokales Minimum besitzt.

- Ist $k \in \mathbb{Z}$ ungerade, so ergibt sich wegen $(-1)^k = -1$ dann

$$H_k = \begin{pmatrix} 2 + (-1)^k & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix};$$

wegen $\det H_k = -2 < 0$ ist H_k indefinit, so daß f in $(k\pi, -k\pi)$ einen Sattelpunkt besitzt.

- b) Gemäß a) besitzt die Funktion in allen Punkten $(2\ell\pi, -2\ell\pi)$ mit $\ell \in \mathbb{Z}$ ein (isoliertes) lokales Minimum; dabei gilt

$$f(2\ell\pi, -2\ell\pi) = ((2\ell\pi + (-2\ell\pi))^2 - \cos(2\ell\pi)) = 0^2 - 1 = -1.$$

Wegen

$$f(x, y) = (x + y)^2 - \cos x = \underbrace{(x + y)^2}_{\geq 0} + \underbrace{(-\cos x)}_{\geq -1} \geq 0 + (-1) = -1$$

für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ besitzt f in $(2\ell\pi, -2\ell\pi)$ sogar ein globales Minimum.

7.4 Gegeben ist die Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = x^4 - 3x^2y + y^2.$$

- a) Für alle $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ ist die Funktion

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(t) = f(ta, tb),$$

zu betrachten; für alle $t \in \mathbb{R}$ gilt damit

$$\begin{aligned} g(t) &= f(ta, tb) = (ta)^4 - 3(ta)^2(tb) + (tb)^2 = \\ &= t^4a^4 - 3t^3a^2b + t^2b^2 = t^2(t^2a^4 - 3ta^2b + b^2), \end{aligned}$$

also $g(0) = 0$, und wir treffen die folgende Fallunterscheidung:

- Im Falle $b = 0$ ist

$$g(t) = t^4a^4 \geq 0 = g(0) \quad \text{für alle } t \in \mathbb{R},$$

damit besitzt g in $t = 0$ ein globales Minimum, insbesondere also ein lokales Minimum.

- Im Falle $b \neq 0$ ist $b^2 > 0$, und wegen

$$\underbrace{t^2 a^4}_{\rightarrow 0} - \underbrace{3 t a^2 b}_{\rightarrow 0} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0$$

gibt es ein $\delta > 0$, so daß für alle $t \in]-\delta, \delta[$ stets

$$|t^2 a^4 - 3 t a^2 b| < b^2 \quad \text{bzw.} \quad -b^2 < t^2 a^4 - 3 t a^2 b < b^2$$

und damit

$$g(t) = \underbrace{t^2}_{\geq 0} \cdot \underbrace{(t^2 a^4 - 3 t a^2 b + b^2)}_{> -b^2} \geq 0 = g(0)$$

gilt; damit besitzt g in $t = 0$ ein lokales Minimum.

- b) Es ist $f(0, 0) = 0$. Wegen

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} t = 0 \quad \text{und} \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} t^2 = 0, \quad \text{also} \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} (t, t^2) = (0, 0),$$

gibt es zu jedem $r > 0$ ein $t_0 \in \mathbb{R}^+$ mit $(t_0, t_0^2) \in K_r(0, 0)$, und es gilt

$$f(t_0, t_0^2) = t_0^4 - 3 t_0^2 t_0^2 + (t_0^2)^2 = -t_0^4 \underset{\text{wegen } t_0 > 0}{<} 0 \leq f(0, 0);$$

dabei bezeichnet $K_r(0, 0)$ die offene Kreisscheibe um $(0, 0)$ mit Radius r . Folglich besitzt f in $(0, 0)$ kein lokales Minimum.

7.5 Das Quadrat

$$D = [-2, 2] \times [-2, 2] \subseteq \mathbb{R}^2$$

mit den Eckpunkten $(-2, -2)$, $(2, -2)$, $(2, 2)$ und $(-2, 2)$ ist eine sowohl abgeschlossene als auch beschränkte und damit kompakte Teilmenge von $\mathbb{R}^2$; darüber hinaus ist die Funktion

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = 2xy - x + y,$$

als Polynomfunktion insbesondere stetig. Nach dem Satz von Weierstraß besitzt damit die stetige Funktion f auf der kompakten Menge D eine globale Minimalstelle $(p_1, q_1) \in D$ und eine globale Maximalstelle $(p_2, q_2) \in D$, für alle $(x, y) \in D$ gilt also $f(p_1, q_1) \leq f(x, y) \leq f(p_2, q_2)$. Zur Ermittlung der globalen Extremstellen $(p, q) \in D$ von f haben wir die beiden folgenden Fälle zu unterscheiden:

- Der Punkt (p, q) liegt auf dem Rand ∂D des Quadrats D , also auf einer der vier Quadratseiten:
 - Für die Punkte $(-2, t)$ mit $t \in [-2, 2]$ der linken Quadratseite gilt

$$f(-2, t) = 2 \cdot (-2) \cdot t - (-2) + t = -3t + 2;$$

da die lineare Hilfsfunktion

$$h_1 : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}, \quad h_1(t) = -3t + 2,$$

ihre Extrema nur in den beiden Randpunkten ihres Definitionsintervalls, also in $t = -2$ und $t = 2$ annehmen kann, kommen für (p, q) nur die Eckpunkte $(-2, -2)$ und $(-2, 2)$ in Frage.

- Für die Punkte $(2, t)$ mit $t \in [-2, 2]$ der rechten Quadratseite gilt

$$f(2, t) = 2 \cdot 2 \cdot t - 2 + t = 5t - 2;$$

da die lineare Hilfsfunktion

$$h_2 : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}, \quad h_2(t) = 5t - 2,$$

ihre Extrema nur in den beiden Randpunkten ihres Definitionsintervalls, also in $t = -2$ und $t = 2$ annehmen kann, kommen für (p, q) nur die Eckpunkte $(2, -2)$ und $(2, 2)$ in Frage.

- Für die Punkte $(t, -2)$ mit $t \in [-2, 2]$ der unteren Quadratseite gilt

$$f(t, -2) = 2 \cdot t \cdot (-2) - t + (-2) = -5t - 2;$$

da die lineare Hilfsfunktion

$$h_3 : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}, \quad h_3(t) = -5t - 2,$$

ihre Extrema nur in den beiden Randpunkten ihres Definitionsintervalls, also in $t = -2$ und $t = 2$ annehmen kann, kommen für (p, q) nur die Eckpunkte $(-2, -2)$ und $(2, -2)$ in Frage.

- Für die Punkte $(t, 2)$ mit $t \in [-2, 2]$ der oberen Quadratseite gilt

$$f(t, 2) = 2 \cdot t \cdot 2 - t + 2 = 3t + 2;$$

da die lineare Hilfsfunktion

$$h_4 : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}, \quad h_4(t) = 3t + 2,$$

ihre Extrema nur in den beiden Randpunkten ihres Definitionsintervalls, also in $t = -2$ und $t = 2$ annehmen kann, kommen für (p, q) nur die Eckpunkte $(-2, 2)$ und $(2, 2)$ in Frage.

- Der Punkt (p, q) liegt im Innern $\overset{\circ}{D}$ des Quadrats D ; da f als Polynomfunktion insbesondere partiell differenzierbar ist, ist dann (p, q) ein kritischer Punkt von f mit $\text{grad } f(p, q) = (0, 0)$. Wegen

$$\partial_x f(x, y) = 2y - 1 \quad \text{und} \quad \partial_y f(x, y) = 2x + 1$$

für alle $(x, y) \in D$ kommt für (p, q) nur der Punkt $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ in Frage.

Mit Hilfe der Wertetabelle

(p, q)	$(-2, -2)$	$(-2, 2)$	$(2, -2)$	$(2, 2)$	$(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$
$f(p, q)$	8	-4	-12	8	$\frac{1}{2}$

erkennt man, daß f den maximalen Funktionswert 8 in den Punkten $(-2, -2)$ und $(2, 2)$ sowie den minimalen Funktionswert -12 im Punkt $(2, -2)$ annimmt.

7.6 a) Für die in Abhängigkeit von $c \in \mathbb{R}$ gegebene Funktion

$$f_c : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_c(x, y) = x^2 + y^2 + cxy,$$

gilt $f_c(0, 0) = 0^2 + 0^2 + c \cdot 0 \cdot 0 = 0$; im Falle $|c| \leq 2$ gilt damit

$$\begin{aligned} f_c(x, y) &= x^2 + cxy + y^2 \\ &= \left(x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{c}{2}y + \left(\frac{c}{2}y \right)^2 \right) + y^2 - \left(\frac{c}{2}y \right)^2 \\ &= \underbrace{\left(x + \frac{c}{2}y \right)^2}_{\geq 0} + \underbrace{\left(1 - \left(\frac{c}{2} \right)^2 \right)}_{\substack{\leq 1, \text{ da } |\frac{c}{2}| \leq 1 \\ \geq 0}} \underbrace{y^2}_{\geq 0} \geq 0 = f_c(0, 0), \end{aligned}$$

so daß f_c die absolute Minimalstelle $(0, 0)$ besitzt.

b) Zu der gegebenen Funktion

$$g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x, y) = x^2 + y^2 + e^{xy},$$

ist für ein festes $(x, y) \neq (0, 0)$ die Hilfsfunktion

$$h : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}, \quad h(t) = g(tx, ty),$$

zu betrachten; für alle $t \geq 0$ gilt dabei

$$h(t) = g(tx, ty) = (tx)^2 + (ty)^2 + e^{(tx)(ty)} = t^2(x^2 + y^2) + e^{t^2 xy}.$$

Damit ist h (als Summe und Komposition quadratischer Funktionen und der Exponentialfunktion) differenzierbar, und für alle $t \geq 0$ gilt

$$h'(t) = 2t(x^2 + y^2) + e^{t^2 xy} \cdot (2t xy) = 2t(x^2 + y^2 + e^{t^2 xy} xy);$$

dabei gilt:

- Für $xy \geq 0$ ergibt sich direkt

$$h'(t) = \underbrace{2t}_{>0} \left(\underbrace{x^2 + y^2}_{\geq 0} + \underbrace{e^{t^2 xy}}_{\geq 0} \underbrace{xy}_{\geq 0} \right) \geq 0$$

für alle $t \geq 0$.

- Für $xy \leq 0$ ist $t^2 xy \leq 0$ und damit $e^{t^2 xy} \leq e^0 = 1$, woraus sich mit dem Inversionsgesetz $e^{t^2 xy} xy \geq xy$ und unter Verwendung von a) damit

$$\begin{aligned} h'(t) &= 2t(x^2 + y^2 + e^{t^2 xy} xy) \underset{2t \geq 0}{\geq} 2t(x^2 + y^2 + xy) = \\ &= 2t f_1(x, y) \underset{2t \geq 0}{\geq} 2t f_1(0, 0) = 2t \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

für alle $t \geq 0$ ergibt.

Die differenzierbare Funktion h genügt auf dem abgeschlossenen Intervall $[0, 1]$ insbesondere den Voraussetzungen des Mittelwertsatzes der Differentialrechnung, und damit existiert ein $\xi \in]0, 1[$ mit

$$h(1) - h(0) = h'(\xi) \cdot (1 - 0) = h'(\xi) \geq 0;$$

folglich ist

$$g(x, y) = h(1) \geq h(0) = g(0, 0).$$

Damit besitzt g die absolute Minimalstelle $(0, 0)$.

7.7 a) Die gegebene Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = x^3 + y^2 - xy - x,$$

ist (als Polynomfunktion) beliebig oft stetig differenzierbar, und für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ gilt zum einen

$$\partial_x f(x, y) = 3x^2 - y - 1 \quad \text{und} \quad \partial_y f(x, y) = 2y - x,$$

also

$$\text{grad } f(x, y) = (3x^2 - y - 1, 2y - x),$$

und zum anderen

$$\partial_x \partial_x f(x, y) = 6x \quad \text{und} \quad \partial_y \partial_y f(x, y) = 2$$

sowie

$$\partial_x \partial_y f(x, y) = -1 = \partial_y \partial_x f(x, y),$$

also

$$\text{Hess } f(x, y) = \begin{pmatrix} 6x & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Als lokale Extremstellen oder Sattelpunkte der auf ganz $\mathbb{R}^2$ definierten und partiell differenzierbaren Funktion f kommen ausschließlich ihre kritischen Stellen, also die Punkte $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ mit $\text{grad } f(x, y) = (0, 0)$ in Frage. Mit

$$\partial_y f(x, y) = 0 \iff 2y - x = 0 \iff x = 2y$$

ergibt sich

$$\begin{aligned} \partial_x f(x, y) = 0 &\iff 3x^2 - y - 1 = 0 \\ &\stackrel{x=2y}{\iff} 3(2y)^2 - y - 1 = 0 \iff 12y^2 - y - 1 = 0 \\ &\iff y = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 12 \cdot (-1)}}{2 \cdot 12} \\ &\iff y = \frac{1 \pm \sqrt{49}}{24} = \frac{1 \pm 7}{24} \iff y \in \left\{ \frac{1}{3}, -\frac{1}{4} \right\}; \end{aligned}$$

damit besitzt f genau die beiden kritischen Punkte $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$ und $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4})$, die wir nun mit Hilfe der Hessematrix näher untersuchen:

- Es ist $\text{grad } f\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right) = (0, 0)$ mit

$$H_1 = \text{Hess } f\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right) = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix};$$

wegen $\det(H_1) = 7 > 0$ und $\text{Spur}(H_1) = 6 > 0$ ist H_1 positiv definit, so daß f in $\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$ ein isoliertes lokales Minimum besitzt.

- Es ist $\text{grad } f\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}\right) = (0, 0)$ mit

$$H_2 = \text{Hess } f\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}\right) = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix};$$

wegen $\det(H_2) = -7 < 0$ ist H_2 indefinit, so daß f in $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}\right)$ einen Sattelpunkt besitzt.

b) Das gegebene Rechteck

$$R = [-1, 1] \times [-1, 2] \subseteq \mathbb{R}^2$$

mit den Ecken $(-1, -1)$, $(1, -1)$, $(1, 2)$ und $(-1, 2)$ ist eine abgeschlossene wie auch beschränkte und damit kompakte Teilmenge von $\mathbb{R}^2$, so daß die (als Polynomfunktion insbesondere) stetige Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ nach dem Satz von Weierstraß auf R (mindestens) eine globale Minimalstelle und (mindestens) eine globale Maximalstelle besitzt.

Da die Funktion f darüber hinaus partiell differenzierbar ist, kommen für globale Extremstellen $(a, b) \in R$ von f neben der in a) ermittelten lokalen Minimalstelle $\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$ nur Punkte auf dem Rand ∂R des Rechtecks R in Frage:

- Für die Punkte $(-1, t)$ mit $t \in [-1, 2]$ der linken Rechteckseite gilt

$$f(-1, t) = (-1)^3 + t^2 - (-1) \cdot t - (-1) = t^2 + t;$$

da die quadratische Hilfsfunktion

$$h_1 : [-1, 2] \rightarrow \mathbb{R}, \quad h_1(t) = t^2 + t,$$

ihre Extrema nur in den beiden Randpunkten ihres Definitionsintervalls, also in $t = -1$ und $t = 2$, sowie in den Nullstellen ihrer Ableitung

$$h_1'(t) = 2t + 1,$$

also in $t = -\frac{1}{2}$ annehmen kann, kommen für (a, b) nur die Punkte $(-1, -1)$, $(-1, -\frac{1}{2})$ und $(-1, 2)$ in Frage.

- Für die Punkte $(1, t)$ mit $t \in [-1, 2]$ der rechten Rechteckseite gilt

$$f(1, t) = 1^3 + t^2 - 1 \cdot t - (-1) = t^2 - t;$$

da die quadratische Hilfsfunktion

$$h_2 : [-1, 2] \rightarrow \mathbb{R}, \quad h_2(t) = t^2 - t,$$

ihre Extrema nur in den beiden Randpunkten ihres Definitionsintervalls, also in $t = -1$ und $t = 2$, sowie in den Nullstellen ihrer Ableitung

$$h_2'(t) = 2t - 1,$$

also in $t = \frac{1}{2}$ annehmen kann, kommen für (a, b) nur die Punkte $(1, -1)$, $(1, \frac{1}{2})$ und $(1, 2)$ in Frage.

- Für die Punkte $(t, -1)$ mit $t \in [-1, 1]$ der unteren Rechteckseite gilt

$$f(t, -1) = t^3 + (-1)^2 - t \cdot (-1) - t = t^3 + 1;$$

da die kubische Hilfsfunktion

$$h_3 : [-1; 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad h_3(t) = t^3 + 1,$$

bekanntlich streng monoton wächst und damit ihre Extrema nur in den beiden Randpunkten ihres Definitionsintervalls, also in $t = -1$ und $t = 1$, annehmen kann, kommen für (a, b) nur die Punkte $(-1, -1)$ und $(1, -1)$ in Frage.

- Für die Punkte $(t, 2)$ mit $t \in [-1, 1]$ der oberen Rechteckseite gilt

$$f(t, 2) = t^3 + 2^2 - t \cdot 2 - t = t^3 - 3t + 4;$$

da die kubische Hilfsfunktion

$$h_4 : [-1; 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad h_4(t) = t^3 - 3t + 4,$$

ihre Extrema nur in den beiden Randpunkten ihres Definitionsintervalls, also in $t = -1$ und $t = 1$, die hier mit den Nullstellen ihrer Ableitung

$$h_4'(t) = 3t^2 - 3 = 3(t^2 - 1) = 3(t - 1)(t + 1)$$

zusammenfallen, annehmen kann, kommen für (a, b) nur die Punkte $(-1, 2)$ und $(1, 2)$ in Frage.

Mit Hilfe der Wertetabelle

(a, b)	$(\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$	$(-1, -1)$	$(-1, -\frac{1}{2})$	$(-1, 2)$	$(1, -1)$	$(1, \frac{1}{2})$	$(1, 2)$
$f(a, b)$	$-\frac{13}{27}$	0	$-\frac{1}{4}$	6	2	$-\frac{1}{4}$	2

erkennt man, daß f den maximalen Funktionswert 6 im Punkt $(-1, 2)$ sowie den minimalen Funktionswert $-\frac{13}{27}$ im Punkt $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$ annimmt.

7.8 Die gegebene Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = (x^2 + 1) (\sin(\pi y) + 2),$$

ist (als Produkt einer quadratischen und einer trigonometrischen Funktion) beliebig oft stetig partiell differenzierbar, und für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ gilt

$$\partial_x f(x, y) = 2x (\sin(\pi y) + 2) \quad \text{und} \quad \partial_y f(x, y) = (x^2 + 1) \pi \cos(\pi y),$$

also

$$\text{grad } f(x, y) = (2x (\sin(\pi y) + 2), (x^2 + 1) \pi \cos(\pi y)),$$

sowie

$$\partial_x \partial_x f(x, y) = 2 (\sin(\pi y) + 2) \quad \text{und} \quad \partial_y \partial_y f(x, y) = -(x^2 + 1) \pi^2 \sin(\pi y)$$

mit

$$\partial_x \partial_y f(x, y) = 2x \pi \cos(\pi y) = \partial_y \partial_x f(x, y),$$

also

$$\text{Hess } f(x, y) = \begin{pmatrix} 2(\sin(\pi y) + 2) & 2x\pi \cos(\pi y) \\ 2x\pi \cos(\pi y) & -(x^2 + 1)\pi^2 \sin(\pi y) \end{pmatrix}.$$

Als Extremstellen der auf ganz $\mathbb{R}^2$ definierten und partiell differenzierbaren Funktion f kommen nur ihre kritischen Stellen, also die Punkte $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ mit $\text{grad } f(x, y) = (0, 0)$ in Frage, wegen

$$\partial_x f(x, y) = 0 \iff 2x \underbrace{(\sin(\pi y) + 2)}_{\geq (-1) + 2 = 1 > 0} = 0 \iff x = 0$$

und

$$\begin{aligned} \partial_y f(x, y) = 0 &\iff \underbrace{(x^2 + 1)}_{\geq 1 > 0} \pi \cos(\pi y) = 0 \iff \\ &\iff \cos(\pi y) = 0 \iff \pi y \in \frac{\pi}{2} + \mathbb{Z} \cdot \pi \iff y \in \frac{1}{2} + \mathbb{Z} \end{aligned}$$

also genau die Punkte $(0, y_k)$ mit $y_k = \frac{1}{2} + k$ für $k \in \mathbb{Z}$. Wir untersuchen nun diese kritischen Stellen mit Hilfe der Hessematrix, wobei wegen

$$\begin{aligned} \text{Hess } f(0, y_k) &= \begin{pmatrix} 2(\sin(\pi y_k) + 2) & 0 \cdot \cos(\pi y_k) \\ 0 \cdot \cos(\pi y_k) & -\pi^2 \sin(\pi y_k) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2(\sin(\frac{\pi}{2} + k\pi) + 2) & 0 \\ 0 & -\pi^2 \sin(\frac{\pi}{2} + k\pi) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

die folgende Fallunterscheidung motiviert wird:

- Ist $k \in \mathbb{Z}$ gerade, so gilt $\sin(\frac{\pi}{2} + k\pi) = 1$; damit besitzt

$$\text{Hess } f(0, y_k) = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -\pi^2 \end{pmatrix}$$

den positiven Eigenwert 6 und den negativen Eigenwert $-\pi^2$ und ist folglich indefinit. Somit ist $(0, y_k)$ ein Sattelpunkt von f , insbesondere also kein lokales Extremum von f .

- Ist $k \in \mathbb{Z}$ ungerade, so gilt $\sin(\frac{\pi}{2} + k\pi) = -1$; damit besitzt

$$\text{Hess } f(0, y_k) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \pi^2 \end{pmatrix}$$

die beiden positiven Eigenwerte 2 und π^2 und ist folglich positiv definit. Somit ist $(0, y_k)$ ein isoliertes lokales Minimum von f , insbesondere also kein lokales Maximum von f .

Diese Überlegungen beantworten die Teilaufgaben a) und b) folgendermaßen:

- a) Die Funktion f besitzt unendlich viele isolierte lokale Minima, nämlich die Punkte $(0, \frac{1}{2} + k)$ für alle ungeraden $k \in \mathbb{Z}$.
- b) Die Funktion f besitzt keine lokalen Maxima, da die in Frage kommenden kritischen Stellen entweder isolierte lokale Minima oder Sattelpunkte sind.

c) Für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ gilt

$$f(x, y) = \underbrace{\left(\underbrace{x^2}_{\geq 0} + 1\right)}_{\geq 1} \cdot \underbrace{\left(\underbrace{\sin(\pi y)}_{\geq -1} + 2\right)}_{\geq 1} \geq 1;$$

damit ist zunächst $f(\mathbb{R}^2) \subseteq [1, \infty[$. Für „ $\supseteq$ “ sei $z \in [1, \infty[$; wegen $z \geq 1$ ist $z - 1 \geq 0$ und damit $(\sqrt{z-1}, -\frac{1}{2}) \in \mathbb{R}^2$, und es gilt

$$f\left(\sqrt{z-1}, -\frac{1}{2}\right) = \underbrace{\left(\underbrace{\sqrt{z-1}^2}_{=z-1} + 1\right)}_{=z} \cdot \underbrace{\left(\underbrace{\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)}_{=-1} + 2\right)}_{=1} = z \cdot 1 = z,$$

also $z \in f(\mathbb{R}^2)$. Insgesamt erhält man $f(\mathbb{R}^2) = [1, \infty[$.

7.9 a) Die gegebene Funktion

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = (x + y) \cdot e^{xy},$$

ist als Produkt einer linearen Funktion und einer Exponentialfunktion partiell differenzierbar, und für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ gilt

$$\partial_x f(x, y) = 1 \cdot e^{xy} + (x + y) \cdot (e^{xy} \cdot y) = (1 + xy + y^2) e^{xy}$$

sowie

$$\partial_y f(x, y) = 1 \cdot e^{xy} + (x + y) \cdot (e^{xy} \cdot x) = (1 + xy + x^2) e^{xy}.$$

Für einen kritischen Punkt $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ müßte

$$\partial_x f(x, y) = 0 \quad \text{und} \quad \partial_y f(x, y) = 0,$$

wegen $e^{xy} > 0$ also

$$1 + xy + y^2 = 0 \quad \text{und} \quad 1 + xy + x^2 = 0,$$

gelten, woraus

$$y^2 = -(1 + xy) = x^2, \quad \text{also} \quad y = x \quad \text{oder} \quad y = -x,$$

und damit für $y = x$ in $1 + 2x^2 = 0$ sowie für $y = -x$ in $1 = 0$ jeweils ein Widerspruch entsteht. Folglich kann f keine kritischen Punkte besitzen.

b) Die Kreislinie

$$K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 2\}$$

mit dem Mittelpunkt $(0, 0)$ und dem Radius $\sqrt{2}$ ist kompakt, so daß die (als Produkt stetiger Funktionen) stetige Funktion f nach dem Satz von Weierstraß auf K an mindestens einer Stelle p das globale Minimum $f(p)$ und an mindestens einer Stelle q das globale Maximum $f(q)$ annimmt.

Wir betrachten für den Punkt $(x, y) \in K$ die Darstellung $x = \sqrt{2} \cos \varphi$ und $y = \sqrt{2} \sin \varphi$ mit $\varphi \in [0, 2\pi]$ in Polarkoordinaten und erhalten

$$\begin{aligned} f(x, y) = (x + y) \cdot e^{xy} &= (\sqrt{2} \cos \varphi + \sqrt{2} \sin \varphi) \cdot e^{(\sqrt{2} \cos \varphi)(\sqrt{2} \sin \varphi)} \\ &= \sqrt{2} (\cos \varphi + \sin \varphi) \cdot e^{2 \cos \varphi \sin \varphi}; \end{aligned}$$

als Extremstellen der differenzierbaren Hilfsfunktion

$$h : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(\varphi) = \sqrt{2} (\cos \varphi + \sin \varphi) \cdot e^{2 \cos \varphi \sin \varphi},$$

kommen neben den beiden Randpunkten 0 und 2π von $[0, 2\pi]$ nur die Nullstellen der Ableitung

$$\begin{aligned} h'(\varphi) &= \sqrt{2} (-\sin \varphi + \cos \varphi) \cdot e^{2 \cos \varphi \sin \varphi} + \\ &\quad \sqrt{2} (\cos \varphi + \sin \varphi) \cdot (e^{2 \cos \varphi \sin \varphi} \cdot 2 (-\sin \varphi \sin \varphi + \cos \varphi \cos \varphi)) \\ &= \sqrt{2} (\cos \varphi - \sin \varphi) \cdot \underbrace{e^{2 \cos \varphi \sin \varphi}}_{>0} \cdot \underbrace{(1 + 2 (\cos \varphi + \sin \varphi)^2)}_{\geq 1}, \end{aligned}$$

also $\varphi \in [0, 2\pi]$ mit $\cos \varphi = \sin \varphi$, und damit $\varphi = \frac{\pi}{4}$ und $\varphi = \frac{5\pi}{4}$ in Frage, so daß sich die globalen Extrema von f unter den Punkten

$$\underbrace{(\sqrt{2}, 0)}_{\text{für } \varphi = 0 \text{ und } \varphi = 2\pi} \quad \text{sowie} \quad \underbrace{(1, 1)}_{\text{für } \varphi = \frac{\pi}{4}} \quad \text{und} \quad \underbrace{(-1, -1)}_{\text{für } \varphi = \frac{5\pi}{4}}$$

finden. Die Wertetabelle

$$\begin{array}{c|c|c|c} (x, y) & (\sqrt{2}, 0) & (1, 1) & (-1, -1) \\ \hline f(x, y) & \sqrt{2} & 2e & -2e \end{array}$$

zeigt, daß f in $p = (-1, -1)$ das globale Minimum $f(p) = -2e$ sowie in $q = (1, 1)$ das globale Maximum $f(q) = 2e$ annimmt.

7.10 Auf dem abgeschlossenen 1. Quadranten

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0 \text{ und } y \geq 0\}$$

ist die Funktion

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = (x^2 + y^2) \cdot \exp(-x - y),$$

gegeben.

- a) Die Funktion f ist als Produkt einer quadratischen Funktion und der Verkettung der Exponentialfunktion mit einer linearen Funktion (beliebig oft) partiell differenzierbar, und für alle $(x, y) \in D$ mit $x > 0$ und $y > 0$ gilt

$$\begin{aligned} \partial_x f(x, y) &= 2x \cdot \exp(-x - y) + (x^2 + y^2) \cdot (\exp(-x - y) \cdot (-1)) \\ &= (2x - (x^2 + y^2)) \cdot \exp(-x - y) \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} \partial_y f(x, y) &= 2y \cdot \exp(-x - y) + (x^2 + y^2) \cdot (\exp(-x - y) \cdot (-1)) \\ &= (2y - (x^2 + y^2)) \cdot \exp(-x - y). \end{aligned}$$

Für einen kritischen Punkt (x, y) von f gilt

$$\partial_x f(x, y) = 0 \quad \text{und} \quad \partial_y f(x, y) = 0,$$

wegen $\exp(-x - y) > 0$ also

$$2x - (x^2 + y^2) = 0 \quad \text{und} \quad 2y - (x^2 + y^2) = 0,$$

woraus wegen

$$2x = x^2 + y^2 = 2y$$

zunächst $x = y$ und wegen

$$0 = 2y - (x^2 + y^2) = 2y - 2y^2 = 2y \cdot (1 - y) \quad \text{mit} \quad y \neq 0$$

dann $1 - y = 0$, also $(x, y) = (1, 1)$ folgt. Die Probe

$$\partial_x f(1, 1) = 0 \quad \text{und} \quad \partial_y f(1, 1) = 0$$

bestätigt, daß $(1, 1)$ tatsächlich ein kritischer Punkt von f ist.

b) Für alle $(x, y) \in D$ gilt

$$f(x, y) = \underbrace{(x^2 + y^2)}_{\geq 0} \cdot \underbrace{\exp(-x - y)}_{> 0} \geq 0 = f(0, 0),$$

so daß f in $(0, 0)$ das globale Minimum 0 annimmt. Jeder Punkt $(x, y) \in D$ mit $(x, y) \neq (0, 0)$ liegt nun auf (genau) einer Geraden $x + y = a$ mit $a > 0$. Zur Bestimmung des globalen Maximums betrachten wir daher das Verhalten von f auf dem in D liegenden Stück der Geraden $x + y = a$ mit $a > 0$, also auf den Punkten

$$\{(t, a - t) \mid 0 \leq t \leq a\},$$

und erhalten

$$\begin{aligned} f(t, a - t) &= (t^2 + (a - t)^2) \cdot \exp(-t - (a - t)) \\ &= (t^2 + (a^2 - 2at + t^2)) \cdot \exp(-t - a + t) \\ &= (2t^2 - 2at + a^2) \cdot \exp(-a) \\ &= 2 \exp(-a) \cdot (t^2 - at + \frac{1}{2}a^2) \\ &= 2 \exp(-a) \cdot \left(\underbrace{(t - \frac{1}{2}a)^2}_{\geq 0} + \frac{1}{4}a^2 \right); \end{aligned}$$

dies stellt eine nach oben geöffnete Parabel mit dem Scheitel bei $t = \frac{1}{2}a$ dar, die damit ihren maximalen Wert an den beiden dazu symmetrisch liegenden Randpunkten $t = 0$ und $t = a$ annimmt, und es ergibt sich

$$f(t, a - t) \leq f(a, 0) = f(0, a) = a^2 \exp(-a) \quad \text{für alle} \quad t \in [0, a].$$

Die sich ergebende Hilfsfunktion

$$h : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(a) = a^2 \cdot \exp(-a),$$

ist (als Produkt einer quadratischen Funktion und einer Exponentialfunktion) differenzierbar, und für alle $a > 0$ gilt

$$h'(a) = 2a \cdot \exp(-a) + a^2 \cdot (\exp(-a) \cdot (-1)) = (2 - a) \cdot a \cdot \exp(-a);$$

wegen

$$h'(a) = \underbrace{(2-a)}_{\geq 0} \cdot \underbrace{a}_{> 0} \cdot \underbrace{\exp(-a)}_{> 0} \geq 0$$

für alle $a \in]0, 2]$ ist h auf $]0, 2]$ monoton wachsend, und wegen

$$h'(a) = \underbrace{(2-a)}_{\leq 0} \cdot \underbrace{a}_{> 0} \cdot \underbrace{\exp(-a)}_{> 0} \leq 0$$

für alle $a \in [2, +\infty[$ ist h auf $[2, +\infty[$ monoton fallend, woraus sich

$$h(a) \leq h(2) = 2^2 \cdot \exp(-2) = 4e^{-2} \quad \text{für alle } a > 0$$

ergibt. Zusammenfassend erhält man für alle $(x, y) \in D$ mit $(x, y) \neq (0, 0)$ also

$$f(x, y) \stackrel{t=x}{\underset{a=x+y}{=}} f(t, a-t) \leq f(a, 0) = h(a) \leq h(2) = 4e^{-2};$$

wegen $f(2, 0) = f(0, 2) = 4e^{-2}$; nimmt f in den Punkten $(2, 0)$ und $(0, 2)$ das globale Maximum $4e^{-2}$ an.

7.11 a) Die gegebene Funktion

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = e^{xy} + x^2 + y^2,$$

ist als Summe und Komposition der Exponentialfunktion und quadratischer Funktionen beliebig oft stetig partiell differenzierbar, und für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ gilt

$$\partial_x f(x, y) = e^{xy} \cdot y + 2x \quad \text{und} \quad \partial_y f(x, y) = e^{xy} \cdot x + 2y,$$

also

$$\text{grad } f(x, y) = (e^{xy} y + 2x, e^{xy} x + 2y),$$

sowie

$$\partial_x \partial_x f(x, y) = e^{xy} \cdot y^2 + 2 \quad \text{und} \quad \partial_y \partial_y f(x, y) = e^{xy} \cdot x^2 + 2$$

und unter Verwendung des Satzes von Schwarz

$$\partial_x \partial_y f(x, y) = \partial_y \partial_x f(x, y) = (e^{xy} \cdot x) \cdot y + e^{xy} \cdot 1 = e^{xy} (xy + 1),$$

also

$$\text{Hess } f(x, y) = \begin{pmatrix} e^{xy} y^2 + 2 & e^{xy} (xy + 1) \\ e^{xy} (xy + 1) & e^{xy} x^2 + 2 \end{pmatrix}.$$

Für einen kritischen Punkt $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ von f gilt

$$\partial_x f(x, y) = 0 \quad \text{und} \quad \partial_y f(x, y) = 0,$$

also

$$e^{xy} y + 2x = 0 \quad \text{und} \quad e^{xy} x + 2y = 0;$$

wegen

$$e^{xy} x y + 2x^2 = 0 \quad \text{und} \quad e^{xy} x y + 2y^2 = 0$$

ergibt sich

$$2x^2 = -e^{xy}xy = 2y^2, \quad \text{also} \quad x^2 = y^2,$$

und damit $x = y$ oder $x = -y$. Im Falle $x = y$ folgt

$$0 = e^{y^2}y + 2y = \underbrace{(e^{y^2} + 2)}_{>0} \cdot y, \quad \text{also} \quad y = 0 \quad \text{mit} \quad x = 0,$$

und im Fall $x = -y$ ist

$$0 = e^{-y^2}y - 2y = \underbrace{\left(\overbrace{e^{-y^2}}^{\leq 0} - 2 \right)}_{\leq 1} \cdot y, \quad \text{also} \quad y = 0 \quad \text{mit} \quad x = 0,$$

so daß lediglich $(0, 0)$ als kritischer Punkt von f in Frage kommt; wegen

$$\partial_x f(0, 0) = e^0 \cdot 0 + 2 \cdot 0 = 0 \quad \text{und} \quad \partial_y f(x, y) = e^0 \cdot 0 + 2 \cdot 0 = 0$$

ist $(0, 0)$ tatsächlich ein kritischer Punkt von f , und f besitzt genau einen kritischen Punkt, nämlich $(0, 0)$.

b) Die Hessematrix von f im kritischen Punkt $(0, 0)$ ist

$$H = \text{Hess } f(0, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2};$$

wegen $\det(H) = 3 > 0$ und $\text{Spur}(H) = 4 > 0$ ist H positiv definit, und damit besitzt f in $(0, 0)$ ein (isoliertes) lokales Minimum.

7.12 Zu betrachten ist die Menge

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 2\pi \quad \text{und} \quad \cos x \leq y \leq \sin x\};$$

wegen

$$\cos x = \sin x \iff 1 = \tan x \iff x \in \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} \right\}$$

für alle $x \in [0; 2\pi]$ besitzen die beiden Graphen $G_{\cos}$ und $G_{\sin}$ in diesem Bereich genau die beiden Schnittpunkte $S_1 = \left(\frac{\pi}{4}, \frac{1}{2}\sqrt{2}\right)$ und $S_2 = \left(\frac{5\pi}{4}, -\frac{1}{2}\sqrt{2}\right)$, und wegen

$$\cos x \leq \sin x \iff x \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} \right]$$

ist $D \subseteq \mathbb{R}^2$ genau der abgeschlossene Bereich, der von den Graphen $G_{\cos}$ und $G_{\sin}$ zwischen ihren Schnittpunkten S_1 und S_2 begrenzt wird:

Für alle $(x, y) \in D$ gilt

$$\begin{aligned}
 f(x, y) &= (y - \sin x)(y - \cos x) \\
 &= y^2 - (\sin x + \cos x)y + \sin x \cos x \\
 &= \left(y^2 - 2 \cdot \frac{\sin x + \cos x}{2} \cdot y + \left(\frac{\sin x + \cos x}{2} \right)^2 \right) + \\
 &\quad + \sin x \cos x - \left(\frac{\sin x + \cos x}{2} \right)^2 \\
 &= \left(y - \frac{\sin x + \cos x}{2} \right)^2 + \sin x \cos x - \frac{\sin^2 x + 2 \sin x \cos x + \cos^2 x}{4} \\
 &= \left(y - \frac{\sin x + \cos x}{2} \right)^2 + \frac{2 \sin x \cos x}{4} - \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{4} \\
 &= \underbrace{\left(y - \frac{\sin x + \cos x}{2} \right)^2}_{\geq 0} + \underbrace{\frac{\sin(2x)}{4}}_{\geq -\frac{1}{4}} - \frac{1}{4} \geq 0 - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

mit

$$f\left(\frac{3}{4}\pi, 0\right) = \underbrace{\left(0 - \sin \frac{3}{4}\pi\right)}_{=\frac{1}{2}\sqrt{2}} \underbrace{\left(0 - \cos \frac{3}{4}\pi\right)}_{=-\frac{1}{2}\sqrt{2}} = -\frac{1}{2}\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{2} = -\frac{1}{2},$$

also

$$f(x, y) \geq -\frac{1}{2} = f\left(\frac{3}{4}\pi, 0\right),$$

so daß $\left(\frac{3}{4}\pi, 0\right)$ eine globale Minimalstelle der Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ist.

7.13 a) Für die gegebene Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \ln(x^2 + (y - 1)^2 + 1),$$

sind die Niveaumengen

$$N_f(c) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = c\}$$

für $c = 0$, $c = 1$ und $c = \ln 4$ zu betrachten:

- Für $c = 0$ ergibt sich

$$\begin{aligned}
 f(x, y) = 0 &\iff \ln(x^2 + (y - 1)^2 + 1) = 0 \\
 &\iff x^2 + (y - 1)^2 + 1 = 1 \iff x^2 + (y - 1)^2 = 0 \\
 &\iff (x = 0 \text{ und } y - 1 = 0) \iff (x, y) = (0, 1)
 \end{aligned}$$

für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, so daß $N_f(0)$ nur aus dem Punkt $(0, 1)$ besteht.

- Für $c = 1$ ergibt sich

$$\begin{aligned}
 f(x, y) = 1 &\iff \ln(x^2 + (y - 1)^2 + 1) = 1 \\
 &\iff x^2 + (y - 1)^2 + 1 = e \iff x^2 + (y - 1)^2 = e - 1
 \end{aligned}$$

für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, so daß $N_f(1)$ die Kreislinie mit dem Mittelpunkt $(0, 1)$ und dem Radius $\sqrt{e - 1}$ darstellt.

- Für $c = \ln 4$ ergibt sich

$$\begin{aligned} f(x, y) = \ln 4 &\iff \ln(x^2 + (y-1)^2 + 1) = \ln 4 \\ &\iff x^2 + (y-1)^2 + 1 = 4 \iff x^2 + (y-1)^2 = 3 \end{aligned}$$

für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, so daß $N_f(1)$ die Kreislinie mit dem Mittelpunkt $(0, 1)$ und dem Radius $\sqrt{3}$ darstellt.

Damit ergibt sich für die drei Niveaumengen die folgende Skizze:

- b) Die auf ganz $\mathbb{R}^2$ definierte Funktion f ist als Komposition des natürlichen Logarithmus und einer quadratischen Funktion partiell differenzierbar, so daß als lokale Extremstellen lediglich die kritischen Punkte von f in Frage kommen; für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ gilt dabei

$$\partial_x f(x, y) = \frac{1}{x^2 + (y-1)^2 + 1} \cdot (2x)$$

mit

$$\partial_x f(x, y) = 0 \iff 2x = 0 \iff x = 0$$

sowie

$$\partial_y f(x, y) = \frac{1}{x^2 + (y-1)^2 + 1} \cdot (2(y-1))$$

mit

$$\partial_y f(x, y) = 0 \iff 2(y-1) = 0 \iff y = 1,$$

so daß $(0, 1)$ der einzige kritische Punkt und damit der einzige Kandidat für eine Extremstelle von f ist. Für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ gilt

$$\underbrace{x^2}_{\geq 0} + \underbrace{(y-1)^2}_{\geq 0} + 1 \geq 1,$$

woraus mit dem Monotonieverhalten des natürlichen Logarithmus

$$f(x, y) = \ln(x^2 + (y - 1)^2 + 1) \geq \ln 1 = 0 \stackrel{\text{a)}}{=} f(0, 1)$$

folgt; damit besitzt f in $(0, 1)$ ein globales Minimum.

7.14 Die gegebene Polynomfunktion

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = 2x^2 + 2y^2 - 4xy - x^4 - y^4,$$

ist beliebig oft stetig partiell differenzierbar, und für $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ gilt

$$\partial_x f(x, y) = 4x - 4y - 4x^3 \quad \text{und} \quad \partial_y f(x, y) = 4y - 4x - 4y^3,$$

also

$$\text{grad } f(x, y) = (4x - 4y - 4x^3, 4y - 4x - 4y^3),$$

sowie

$$\partial_x \partial_x f(x, y) = 4 - 12x^2 \quad \text{und} \quad \partial_y \partial_y f(x, y) = 4 - 12y^2$$

und

$$\partial_y \partial_x f(x, y) = -4 = \partial_x \partial_y f(x, y),$$

also

$$\text{Hess } f(x, y) = \begin{pmatrix} 4 - 12x^2 & -4 \\ -4 & 4 - 12y^2 \end{pmatrix}.$$

Als lokale Extremstellen der auf ganz $\mathbb{R}^2$ definierten und partiell differenzierbaren Funktion f kommen lediglich ihre kritischen Punkte $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ mit $\text{grad } f(x, y) = (0, 0)$ in Frage: wegen

$$\partial_x f(x, y) = 0 \iff 4x - 4y - 4x^3 = 0 \iff x - y = x^3$$

und

$$\partial_y f(x, y) = 0 \iff 4y - 4x - 4y^3 = 0 \iff y - x = y^3$$

erhält man durch Summenbildung

$$0 = x^3 + y^3, \quad \text{also} \quad y^3 = -x^3 = (-x)^3, \quad \text{und damit} \quad y = -x,$$

woraus etwa mit der ersten Beziehung

$$0 = 4x - 4(-x) - 4x^3 = -4x(x^2 - 2) = -4x(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$$

und damit $x = 0$ (mit $y = 0$) oder $x = \sqrt{2}$ (mit $y = -\sqrt{2}$) oder $x = -\sqrt{2}$ (mit $y = \sqrt{2}$) ergibt. Als Kandidaten für kritische Punkte von f erhalten wir also $(0, 0)$, $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ und $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$, die wir nun mit Hilfe der Hessematrix untersuchen:

- Es ist $\text{grad } f(0, 0) = (0, 0)$ und

$$H_0 = \text{Hess } f(0, 0) = \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ -4 & 4 \end{pmatrix};$$

wegen $\det(H_0) = 0$ ist über die Hessematrix keine Aussage über die kritische Stelle $(0, 0)$ möglich. Es ist $f(0, 0) = 0$, und wir betrachten das Verhalten von f auf den beiden Winkelhalbierenden: wegen

$$f(t, t) = 2t^2 + 2t^2 - 4t \cdot t - t^4 - t^4 = -2t^4 < 0$$

für alle $t \neq 0$ besitzt f in jeder Umgebung von $(0, 0)$ negative Funktionwerte, und wegen

$$\begin{aligned} f(t, -t) &= 2t^2 + 2(-t)^2 - 4t(-t) - t^4 - (-t)^4 = \\ &= 8t^2 - 2t^4 = \underbrace{2t^2}_{>0} \cdot \underbrace{(4 - t^2)}_{>0} > 0 \end{aligned}$$

für alle t mit $0 < |t| < 2$ besitzt f in jeder Umgebung von $(0, 0)$ positive Funktionswerte; damit kann f in $(0, 0)$ kein lokales Extremum besitzen.

- Es ist $\text{grad } f(\sqrt{2}, -\sqrt{2}) = (0, 0)$ und

$$H_1 = \text{Hess } f(\sqrt{2}, -\sqrt{2}) = \begin{pmatrix} -20 & -4 \\ -4 & -20 \end{pmatrix};$$

wegen $\det(H) = 384 > 0$ und $\text{Spur}(H) = -40 < 0$ ist H negativ definit, und f besitzt in $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ ein (isoliertes) lokales Maximum.

- Es ist $\text{grad } f(-\sqrt{2}, \sqrt{2}) = (0, 0)$ und

$$H_2 = \text{Hess } f(-\sqrt{2}, \sqrt{2}) = \begin{pmatrix} -20 & -4 \\ -4 & -20 \end{pmatrix};$$

es ist $H_2 = H_1$ negativ definit, und f besitzt in $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ ein (isoliertes) lokales Maximum.

7.15 Die gegebene Polynomfunktion

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy,$$

ist beliebig oft stetig partiell differenzierbar, und für $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ gilt

$$\partial_x f(x, y) = 3x^2 - 3y \quad \text{und} \quad \partial_y f(x, y) = 3y^2 - 3x,$$

also

$$\text{grad } f(x, y) = (3x^2 - 3y, 3y^2 - 3x),$$

sowie

$$\partial_x \partial_x f(x, y) = 6x \quad \text{und} \quad \partial_y \partial_y f(x, y) = 6y$$

und

$$\partial_y \partial_x f(x, y) = -3 = \partial_x \partial_y f(x, y),$$

also

$$\text{Hess } f(x, y) = \begin{pmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{pmatrix}.$$

Als lokale Extremstellen der auf ganz $\mathbb{R}^2$ definierten und partiell differenzierbaren Funktion f kommen lediglich ihre kritischen Punkte $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ mit $\text{grad } f(x, y) = (0, 0)$ in Frage: wegen

$$\partial_x f(x, y) = 0 \iff 3x^2 - 3y = 0 \iff x^2 = y$$

und

$$\partial_y f(x, y) = 0 \iff 3y^2 - 3x = 0 \iff y^2 = x$$

erhält man durch Einsetzen

$$x = y^2 = (x^2)^2 = x^4, \quad \text{also} \quad 0 = x^4 - x = x \cdot (x^3 - 1),$$

woraus $x = 0$ (mit $y = 0$) oder $x^3 = 1$, also $x = 1$ (mit $y = 1$) folgt. Als Kandidaten für kritische Punkte von f erhalten wir also $(0, 0)$ und $(1, 1)$, die wir nun mit Hilfe der Hessematrix untersuchen:

- Es ist $\text{grad } f(0, 0) = (0, 0)$ und

$$H_1 = \text{Hess } f(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix};$$

wegen $\det(H_1) = -9 < 0$ ist H_1 indefinit, und f besitzt in $(0, 0)$ einen Sattelpunkt, insbesondere also kein lokales Extremum.

- Es ist $\text{grad } f(1, 1) = (0, 0)$ und

$$H_2 = \text{Hess } f(1, 1) = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix};$$

wegen $\det(H_2) = 27 > 0$ und $\text{Spur}(H_2) = 12 > 0$ ist H_2 positiv definit, und f besitzt in $(1, 1)$ ein (isoliertes) lokales Minimum.

7.16 a) Die gegebene Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(r) = e^{-r^2} + r^2,$$

ist als Summe und Komposition der Exponentialfunktion und quadratischer Funktionen stetig und (beliebig oft) differenzierbar, und für alle $r \in \mathbb{R}$ gilt

$$f'(r) = e^{-r^2} \cdot (-2r) + 2r = 2r \left(1 - e^{-r^2}\right).$$

Für alle $r \neq 0$ ist $r^2 > 0$, also $-r^2 < 0$, und unter Verwendung des Monotonieverhaltens der Exponentialfunktion damit

$$e^{-r^2} < e^0 = 1 \quad \text{bzw.} \quad 1 - e^{-r^2} > 0,$$

woraus sich

$$f'(r) = 2r \cdot \underbrace{\left(1 - e^{-r^2}\right)}_{>0} \begin{cases} > 0, & \text{für } r > 0, \\ < 0, & \text{für } r < 0, \end{cases}$$

ergibt; damit ist die stetige Funktion f auf $]-\infty; 0]$ streng monoton fallend und auf $[0; +\infty[$ streng monoton wachsend, besitzt also genau eine globale Extremstelle, nämlich ein globales Minimum in $r = 0$ mit $f(0) = 1$.

b) Die gegebene Funktion

$$g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x, y) = e^{-x^2-y^2} + x^2 + y^2,$$

ist als Summe und Komposition der Exponentialfunktion und quadratischer Funktionen beliebig oft stetig partiell differenzierbar, und für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ gilt

$$\partial_x g(x, y) = e^{-x^2-y^2} \cdot (-2x) + 2x = 2x \left(1 - e^{-x^2-y^2}\right)$$

und

$$\partial_y g(x, y) = e^{-x^2-y^2} \cdot (-2y) + 2y = 2y \left(1 - e^{-x^2-y^2}\right)$$

sowie

$$\begin{aligned} \partial_x \partial_x g(x, y) &= 2 \left(1 - e^{-x^2-y^2}\right) + 2x \left(-e^{-x^2-y^2} \cdot (-2x)\right) \\ &= 2 \left(1 - e^{-x^2-y^2}\right) + 4x^2 e^{-x^2-y^2}, \end{aligned}$$

entsprechend

$$\begin{aligned} \partial_y \partial_y g(x, y) &= 2 \left(1 - e^{-x^2-y^2}\right) + 2y \left(-e^{-x^2-y^2} \cdot (-2y)\right) \\ &= 2 \left(1 - e^{-x^2-y^2}\right) + 4y^2 e^{-x^2-y^2}, \end{aligned}$$

und unter Verwendung des Satzes von Schwarz

$$\partial_x \partial_y g(x, y) = \partial_y \partial_x g(x, y) = 2x \left(-e^{-x^2-y^2} \cdot (-2y)\right) = 4xy e^{-x^2-y^2}.$$

Für einen kritischen Punkt $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ von g gilt

$$\partial_x g(x, y) = 0 \quad \text{und} \quad \partial_y g(x, y) = 0;$$

wegen

$$\begin{aligned} 1 - e^{-x^2-y^2} = 0 &\iff e^{-x^2-y^2} = 1 \iff -x^2 - y^2 = 0 \iff \\ &\iff x^2 + y^2 = 0 \iff (x = 0 \quad \text{und} \quad y = 0) \end{aligned}$$

ergibt sich

$$\begin{aligned} \partial_x g(x, y) = 0 &\iff 2x \left(1 - e^{-x^2-y^2}\right) = 0 \iff \\ &\iff (x = 0 \quad \text{oder} \quad 1 - e^{-x^2-y^2} = 0) \iff x = 0 \end{aligned}$$

und entsprechend

$$\begin{aligned} \partial_y g(x, y) = 0 &\iff 2y \left(1 - e^{-x^2-y^2}\right) = 0 \iff \\ &\iff (y = 0 \quad \text{oder} \quad 1 - e^{-x^2-y^2} = 0) \iff y = 0. \end{aligned}$$

Damit besitzt g genau einen kritischen Punkt, nämlich $(0, 0)$, und es gilt

$$\text{Hess } g(0, 0) = \begin{pmatrix} \partial_x \partial_y g(0, 0) & \partial_x \partial_y g(0, 0) \\ \partial_y \partial_x g(0, 0) & \partial_y \partial_y g(0, 0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- c) Als globale Extremstelle der partiell differenzierbaren und auf ganz $\mathbb{R}^2$ definierten Funktion g kommt nur ihr kritischer Punkt $(0, 0)$ mit

$$g(0, 0) = e^{-0^2-0^2} + 0^2 + 0^2 = e^0 = 1$$

in Frage. Für einen Punkt $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ betrachten wir seine Polarkoordinaten $x = r \cos \varphi$ und $y = r \sin \varphi$ mit $r \in \mathbb{R}_0^+$ und $\varphi \in [0, 2\pi]$ und erhalten

$$x^2 + y^2 = (r \cos \varphi)^2 + (r \sin \varphi)^2 = r^2 (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = r^2$$

und damit

$$g(x, y) = e^{-(x^2+y^2)} + (x^2 + y^2) = e^{-r^2} + r^2 = f(r) \underset{\text{a)}}{\geq} f(0) = 1 = g(0, 0);$$

folglich besitzt g in $(0, 0)$ ein globales Minimum.

- 7.17 a) Die gegebene Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = x y \exp(x - y),$$

ist als Produkt und Verknüpfung linearer Funktionen und der Exponentialfunktion partiell differenzierbar, und für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ gilt

$$\begin{aligned} \partial_x f(x, y) &= y \cdot \exp(x - y) + x y \cdot (\exp(x - y) \cdot 1) = \\ &= (y + x y) \exp(x - y) = y(1 + x) \exp(x - y) \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} \partial_y f(x, y) &= x \cdot \exp(x - y) + x y \cdot (\exp(x - y) \cdot (-1)) = \\ &= (x - x y) \exp(x - y) = x(1 - y) \exp(x - y), \end{aligned}$$

insgesamt also

$$\begin{aligned} \text{grad } f(x, y) &= (\partial_x f(x, y), \partial_y f(x, y)) = \\ &= (y(1 + x) \exp(x - y), x(1 - y) \exp(x - y)). \end{aligned}$$

Wegen

$$\begin{aligned} \partial_x f(x, y) = 0 &\iff y(1 + x) \underbrace{\exp(x - y)}_{>0} = 0 \iff \\ &\iff (y = 0 \text{ oder } 1 + x = 0) \iff (y = 0 \text{ oder } x = -1) \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} \partial_y f(x, y) = 0 &\iff x(1 - y) \underbrace{\exp(x - y)}_{>0} = 0 \iff \\ &\iff (x = 0 \text{ oder } 1 - y = 0) \iff (x = 0 \text{ oder } y = 1) \end{aligned}$$

ergibt sich

$$\text{grad } f(x, y) = (0, 0) \iff ((x, y) = (0, 0) \text{ oder } (x, y) = (-1, 1)).$$

- b) Die gegebene Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ist sogar beliebig oft stetig partiell differenzierbar, und für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ gilt

$$\begin{aligned}\partial_x \partial_x f(x, y) &= y \cdot \exp(x - y) + y(1 + x) \cdot (\exp(x - y) \cdot 1) = \\ &= (y + y(1 + x)) \exp(x - y) = y(2 + x) \exp(x - y)\end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}\partial_y \partial_y f(x, y) &= -x \cdot \exp(x - y) + x(1 - y) \cdot (\exp(x - y) \cdot (-1)) = \\ &= (-x - x(1 - y)) \exp(x - y) = x(y - 2) \exp(x - y)\end{aligned}$$

sowie unter Verwendung des Satzes von Schwarz

$$\begin{aligned}\partial_x \partial_y f(x, y) &= \partial_y \partial_x f(x, y) = \\ &= (1 + x) \cdot \exp(x - y) + y(1 + x) \cdot (\exp(x - y) \cdot (-1)) = \\ &= ((1 + x) - y(1 + x)) \exp(x - y) = (1 + x)(1 - y) \exp(x - y),\end{aligned}$$

und wir erhalten die Hessematrix

$$\begin{aligned}\text{Hess } f(x, y) &= \begin{pmatrix} \partial_x \partial_x f(x, y) & \partial_x \partial_y f(x, y) \\ \partial_y \partial_x f(x, y) & \partial_y \partial_y f(x, y) \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} y(2 + x) \exp(x - y) & (1 + x)(1 - y) \exp(x - y) \\ (1 + x)(1 - y) \exp(x - y) & x(y - 2) \exp(x - y) \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Als lokale Extremstellen der partiell differenzierbaren und auf ganz $\mathbb{R}^2$ definierten Funktion f kommen nur ihre kritischen Punkte $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ mit $\text{grad } f(x, y) = (0, 0)$, gemäß a) also $(0, 0)$ und $(-1, 1)$, in Frage.

- Die Hessematrix

$$\text{Hess } f(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

ist wegen $\det \text{Hess } f(0, 0) = -1 < 0$ indefinit; damit besitzt f in $(0, 0)$ einen Sattelpunkt, insbesondere also kein lokales Extremum.

- Die Hessematrix

$$\text{Hess } f(-1, 1) = \begin{pmatrix} e^{-2} & 0 \\ 0 & e^{-2} \end{pmatrix}$$

besitzt den doppelten Eigenwert $e^{-2} > 0$ und ist demnach positiv definit; damit besitzt f in $(-1, 1)$ ein (isoliertes) lokales Minimum.

- 7.18 a) Die Nullstellenmenge N_f der gegebenen Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = x^2(x^2 + y^2 - 2),$$

besteht wegen

$$\begin{aligned}f(x, y) = 0 &\iff x^2(x^2 + y^2 - 2) = 0 \iff \\ &\iff x^2 = 0 \text{ oder } x^2 + y^2 - 2 = 0 \iff x = 0 \text{ oder } x^2 + y^2 = 2\end{aligned}$$

für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ genau aus der y -Achse $x = 0$ und aus der Kreislinie $x^2 + y^2 = 2$ um den Ursprung mit Radius $r = \sqrt{2}$. Für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus N_f$ gilt $x \neq 0$, also $x^2 > 0$, und damit

$$\begin{aligned} f(x, y) > 0 &\iff x^2(x^2 + y^2 - 2) > 0 \iff \\ &\iff x^2 + y^2 - 2 > 0 \iff x^2 + y^2 > 2 \end{aligned}$$

sowie

$$\begin{aligned} f(x, y) < 0 &\iff x^2(x^2 + y^2 - 2) < 0 \iff \\ &\iff x^2 + y^2 - 2 < 0 \iff x^2 + y^2 < 2. \end{aligned}$$

- b) Die Funktion f ist (als Polynomfunktion) beliebig oft stetig partiell differenzierbar, und für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ gilt wegen

$$f(x, y) = x^2(x^2 + y^2 - 2) = x^4 + x^2y^2 - 2x^2$$

zum einen

$$\text{grad } f(x, y) = (4x^3 + 2xy^2 - 4x, 2x^2y)$$

und zum anderen

$$\text{Hess } f(x, y) = \begin{pmatrix} 12x^2 + 2y^2 - 4 & 4xy \\ 4xy & 2x^2 \end{pmatrix}.$$

Damit kommen als lokale Extremstellen von f lediglich die kritischen Stellen von f , also die Nullstellen von $\text{grad } f$ in Frage: für alle $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ mit $a = 0$ ist $\text{grad } f(a, b) = (0, 0)$, und für alle $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ mit $a \neq 0$ gilt

$$\begin{aligned} \text{grad } f(a, b) = (0, 0) &\iff 4a^3 + 2ab^2 - 4a = 0 \text{ und } 2a^2b = 0 \\ &\iff 2a^2 + b^2 - 2 = 0 \text{ und } b = 0 \\ &\iff a^2 = 1 \text{ und } b = 0 \\ &\iff (a, b) = (\pm 1, 0). \end{aligned}$$

Gemäß der Skizze von a) ergibt sich dabei für alle $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ mit $a = 0$:

- Für $|b| < \sqrt{2}$ ist $r = \sqrt{2} - |b| > 0$, und für alle $(x, y) \in K_r(0, b)$ gilt $f(x, y) \leq 0 = f(0, b)$; damit besitzt f in $(0, b)$ ein lokales Maximum.
- Für $|b| > \sqrt{2}$ ist $r = |b| - \sqrt{2} > 0$, und für alle $(x, y) \in K_r(0, b)$ gilt $f(x, y) \geq 0 = f(0, b)$; damit besitzt f in $(0, b)$ ein lokales Minimum.
- Für $|b| = \sqrt{2}$ gibt es für jedes $r > 0$ in $K_r(0, b)$ Punkte (x', y') mit $f(x', y') < 0 = f(0, b)$ und Punkte (x'', y'') mit $f(x'', y'') > 0 = f(0, b)$; damit besitzt f in $(0, b)$ kein Extremum.

Des weiteren besitzt

$$\text{Hess } f(\pm 1, 0) = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

zwei positive Eigenwerte und ist damit positiv definit; folglich besitzt f in $(\pm 1, 0)$ isolierte lokale Minima.

7.19 a) Die gegebene Menge

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y \geq 0 \text{ und } x^2 + y^2 = 3\}$$

beinhaltet genau diejenigen Punkte der Kreislinie $x^2 + y^2 = 3$ mit dem Mittelpunkt $(0, 0)$ und dem Radius $\sqrt{3}$, die auf oder oberhalb der zweiten Winkelhalbierenden $y = -x$ liegen:

- b) Die Menge $D \subseteq \mathbb{R}^2$ ist abgeschlossen und beschränkt, mithin kompakt, und die gegebene Funktion

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \exp(x + y),$$

ist als Komposition der Exponentialfunktion und einer linearen Funktion stetig; folglich nimmt die Funktion f nach dem Satz von Weierstraß ihr Maximum und ihr Minimum an.

- c) Für einen Punkt $(x, y) \in D$ betrachten wir seine Polarkoordinaten

$$x = r \cos \varphi \quad \text{und} \quad y = r \sin \varphi \quad \text{mit} \quad r = \sqrt{3} \quad \text{und} \quad \varphi \in \left[-\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4} \right]$$

und erhalten

$$f(x, y) = f(\sqrt{3} \cos \varphi, \sqrt{3} \sin \varphi) = \exp(\sqrt{3} \cos \varphi + \sqrt{3} \sin \varphi).$$

Die (als Komposition der Exponentialfunktion und einer Linearkombination von Cosinus und Sinus) differenzierbare Hilfsfunktion

$$h : \left[-\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4} \right] \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(\varphi) = \exp(\sqrt{3} \cos \varphi + \sqrt{3} \sin \varphi),$$

kann ihre Extrema in den beiden Randpunkten $-\frac{\pi}{4}$ und $\frac{3\pi}{4}$ des Definitionsintervalls $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4} \right]$ sowie in den Nullstellen ihrer Ableitung h' mit

$$h'(\varphi) = \exp(\sqrt{3} \cos \varphi + \sqrt{3} \sin \varphi) \cdot (-\sqrt{3} \sin \varphi + \sqrt{3} \cos \varphi)$$

für alle $\varphi \in \left[-\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}\right]$ annehmen; dabei gilt

$$\begin{aligned} h'(\varphi) = 0 &\iff \\ &\iff \underbrace{\exp\left(\sqrt{3}\cos\varphi + \sqrt{3}\sin\varphi\right)}_{>0} \cdot \left(-\sqrt{3}\sin\varphi + \sqrt{3}\cos\varphi\right) = 0 \iff \\ &\iff -\sqrt{3}\sin\varphi + \sqrt{3}\cos\varphi = 0 \iff \cos\varphi = \sin\varphi \iff \varphi = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Damit kommen als globale Extremstellen von f nur die Punkte $\left(\frac{\sqrt{6}}{2}; -\frac{\sqrt{6}}{2}\right)$ und $\left(-\frac{\sqrt{6}}{2}; \frac{\sqrt{6}}{2}\right)$ sowie $\left(\frac{\sqrt{6}}{2}; \frac{\sqrt{6}}{2}\right)$ in Frage; die Wertetabelle

(x, y)	$\left(\frac{\sqrt{6}}{2}; -\frac{\sqrt{6}}{2}\right)$	$\left(-\frac{\sqrt{6}}{2}; \frac{\sqrt{6}}{2}\right)$	$\left(\frac{\sqrt{6}}{2}; \frac{\sqrt{6}}{2}\right)$
$f(x, y)$	1	1	$e^{\sqrt{6}}$

zeigt, daß die Funktion f ihr globales Maximum $e^{\sqrt{6}}$ im Punkt $\left(\frac{\sqrt{6}}{2}; \frac{\sqrt{6}}{2}\right)$ sowie ihr globales Minimum 1 in den Punkten $\left(\frac{\sqrt{6}}{2}; -\frac{\sqrt{6}}{2}\right)$ und $\left(-\frac{\sqrt{6}}{2}; \frac{\sqrt{6}}{2}\right)$ annimmt.

7.20 Die (als Produkt und Komposition von Polynomfunktionen und der Exponentialfunktion insbesondere) stetige Funktion

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)} \cdot (-x^2 + 1),$$

besitzt auf der kompakten Einheitskreisscheibe

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

nach dem Satz von Weierstraß mindestens ein globales Minimum und mindestens ein globales Maximum, es gibt also (a, b) und $(c, d) \in D$ mit

$$f(a, b) \leq f(x, y) \leq f(c, d)$$

für alle $(x, y) \in D$; für die Lage dieser Extremstellen $(p, q) \in D$ gibt es die folgenden beiden Möglichkeiten:

- (p, q) liegt auf dem Rand von D , also auf der Kreislinie $x^2 + y^2 = 1$ um $(0, 0)$ mit Radius 1; wegen

$$f(p, q) = e^{-(p^2+q^2)} \cdot (-p^2 + 1) = e^{-1} \cdot q^2$$

kommen hier nur $q = 0$ mit $p = \pm 1$, also $(\pm 1, 0)$, sowie $q = \pm 1$ mit $p = 0$, also $(0, \pm 1)$ in Frage.

- (p, q) liegt im Innern von D , also in der offenen Kreisscheibe $x^2 + y^2 < 1$; da aber f partiell differenzierbar mit

$$\begin{aligned} \partial_1 f(x, y) &= \left(e^{-(x^2+y^2)} \cdot (-2x)\right) \cdot (-x^2 + 1) + e^{-(x^2+y^2)} \cdot (-2x) \\ &= -2x \cdot e^{-(x^2+y^2)} \cdot (2 - x^2) \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}\partial_2 f(x, y) &= \left(e^{-(x^2+y^2)} \cdot (-2y) \right) \cdot (-x^2 + 1) \\ &= -2y \cdot e^{-(x^2+y^2)} \cdot (1 - x^2)\end{aligned}$$

für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ist, muß (p, q) dann eine kritische Stelle von f sein, so daß wegen

$$\partial_1 f(p, q) = 0 \iff -2p \cdot \underbrace{e^{-(p^2+q^2)}}_{>0} \cdot \underbrace{(2-p^2)}_{>0} \iff p = 0$$

und

$$\partial_2 f(p, q) = 0 \iff -2q \cdot \underbrace{e^{-(p^2+q^2)}}_{>0} \cdot \underbrace{(1-q^2)}_{>0} \iff q = 0$$

kommt hier für (p, q) nur der Punkt $(0, 0)$ in Frage.

Der Vergleich der Funktionswerte

$$\begin{array}{c|c|c|c|c|c} (p, q) & (1, 0) & (-1, 0) & (0, 1) & (0, -1) & (0, 0) \\ \hline f(p, q) & 0 & 0 & e^{-1} & e^{-1} & 1 \end{array}$$

zeigt, daß die Funktion f im Punkt $(0, 0)$ ihr Maximum 1 sowie in den Punkten $(1, 0)$ und $(-1, 0)$ ihr Minimum 0 annimmt.

7.21 Die gegebene Funktion

$$f : \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = x^y - y^x = e^{y \ln x} - e^{x \ln y},$$

ist (als Differenz sowie Produkt und Komposition einer linearen Funktion sowie der Exponentialfunktionen und des natürlichen Logarithmus) selbst beliebig oft stetig partiell differenzierbar, und für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$ gilt

$$\partial_1 f(x, y) = e^{y \ln x} \cdot \frac{y}{x} - e^{x \ln y} \cdot \ln y$$

und

$$\partial_2 f(x, y) = e^{y \ln x} \cdot \ln x - e^{x \ln y} \cdot \frac{x}{y};$$

wegen

$$\partial_1 f(e, e) = e^{e \ln e} \cdot \frac{e}{e} - e^{e \ln e} \cdot \ln e = e^e \cdot 1 - e^e \cdot 1 = 0$$

und

$$\partial_2 f(e, e) = e^{e \ln e} \cdot \ln e - e^{e \ln e} \cdot \frac{e}{e} = e^e \cdot 1 - e^e \cdot 1 = 0,$$

also $\text{grad } f(e, e) = (0, 0)$, ist (e, e) ein kritischer Punkt von f . Ferner gilt

$$\partial_1 \partial_1 f(x, y) = \left(\left(e^{y \ln x} \cdot \frac{y}{x} \right) \cdot \frac{y}{x} + e^{y \ln x} \cdot \left(-\frac{y}{x^2} \right) \right) - e^{x \ln y} \cdot (\ln y)^2$$

und

$$\partial_2 \partial_2 f(x, y) = e^{y \ln x} \cdot (\ln x)^2 - \left(\left(e^{x \ln y} \cdot \frac{x}{y} \right) \cdot \frac{x}{y} + e^{x \ln y} \cdot \left(-\frac{x}{y^2} \right) \right)$$

sowie

$$\begin{aligned} \partial_2 \partial_1 f(x, y) &= \left((e^{y \ln x} \cdot \ln x) \cdot \frac{y}{x} + e^{y \ln x} \cdot \frac{1}{x} \right) - \\ &\quad - \left(\left(e^{x \ln y} \cdot \frac{x}{y} \right) \cdot \ln y + e^{x \ln y} \cdot \frac{1}{y} \right) = \partial_1 \partial_2 f(x, y) \end{aligned}$$

für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$. Wegen

$$\partial_1 \partial_1 f(e, e) = \left(\left(e^{e \ln e} \cdot \frac{e}{e} \right) \cdot \frac{e}{e} + e^{e \ln e} \cdot \left(-\frac{e}{e^2} \right) \right) - e^{e \ln e} \cdot (\ln e)^2 = -e^{e-1}$$

und

$$\partial_2 \partial_2 f(e, e) = e^{e \ln e} \cdot (\ln e)^2 - \left(\left(e^{e \ln e} \cdot \frac{e}{e} \right) \cdot \frac{e}{e} + e^{e \ln e} \cdot \left(-\frac{e}{e^2} \right) \right) = e^{e-1}$$

sowie

$$\begin{aligned} \partial_1 \partial_2 f(e, e) &= \partial_2 \partial_1 f(e, e) = \\ &= \left((e^{e \ln e} \cdot \ln e) \cdot \frac{e}{e} + e^{e \ln e} \cdot \frac{1}{e} \right) - \left(\left(e^{e \ln e} \cdot \frac{e}{e} \right) \cdot \ln e + e^{e \ln e} \cdot \frac{1}{e} \right) = 0 \end{aligned}$$

besitzt die Hessematrix von f im Punkt (e, e) die Diagonalgestalt

$$\text{Hess } f(e, e) = \begin{pmatrix} \partial_1 \partial_1 f(e, e) & \partial_1 \partial_2 f(e, e) \\ \partial_2 \partial_1 f(e, e) & \partial_2 \partial_2 f(e, e) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -e^{e-1} & 0 \\ 0 & e^{e-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

mit dem positiven Eigenwert e^{e-1} und dem negativen Eigenwert $-e^{e-1}$; folglich ist $\text{Hess } f(e, e)$ indefinit, und f besitzt in (e, e) einen Sattelpunkt, insbesondere also weder ein lokales Minimum noch ein lokales Maximum.

7.22 Die zu betrachtende Menge

$$W = \{ e^{-(x+y)} (x^2 + y^2 + xy - 3) \mid x, y \geq 0 \}$$

ist genau der Wertebereich der Funktion

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = e^{-(x+y)} (x^2 + y^2 + xy - 3),$$

mit dem Definitionsbereich $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0 \text{ und } y \geq 0\}$.

Zunächst gilt für alle $(x, y) \in D$ wegen $x \geq 0$ und $y \geq 0$

- zum einen $-3 \leq x^2 + y^2 + xy - 3$ und damit wegen $e^{-(x+y)} > 0$ auch

$$-3 \cdot e^{-(x+y)} \leq e^{-(x+y)} (x^2 + y^2 + xy - 3),$$

- und zum anderen $-(x+y) \leq 0$ und damit $e^{-(x+y)} \leq e^0 = 1$, und damit

$$-3 \cdot e^{-(x+y)} \geq -3 \cdot 1 = -3,$$

zusammen demnach

$$f(0,0) = -3 \leq e^{-(x+y)} (x^2 + y^2 + xy - 3) = f(x,y);$$

folglich ist

$$-3 = \min W = \inf W.$$

Jeder Punkt $(x,y) \in D$ mit $(x,y) \neq (0,0)$ liegt nun auf (genau) einer Geraden $x + y = a$ mit $a > 0$. Zur Bestimmung von $\sup W$ betrachten wir daher das Verhalten von f auf dem in D liegenden Stück der Geraden $x + y = a$ mit $a > 0$, also auf den Punkten

$$\{(t; a-t) \mid 0 \leq t \leq a\},$$

und erhalten

$$\begin{aligned} f(t; a-t) &= e^{-(t+(a-t))} (t^2 + (a-t)^2 + t(a-t) - 3) \\ &= e^{-a} (t^2 + a^2 - 2at + t^2 + ta - t^2 - 3) \\ &= e^{-a} (t^2 - at + a^2 - 3) \\ &= e^{-a} \left(\underbrace{\left(t - \frac{1}{2}a\right)^2}_{\geq 0} + \frac{3}{4}a^2 - 3 \right); \end{aligned}$$

dies stellt eine nach oben geöffnete Parabel mit dem Scheitel bei $t = \frac{1}{2}a$ dar, die damit ihren maximalen Wert an den beiden dazu symmetrisch liegenden Randpunkten $t = 0$ und $t = a$ annimmt, und es ergibt sich

$$f(t, a-t) \leq f(a,0) = e^{-a} (a^2 - 3) \quad \text{für alle } t \in [0; a].$$

Die sich ergebende Hilfsfunktion

$$h : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(a) = e^{-a} (a^2 - 3),$$

ist (als Produkt einer Exponentialfunktion und einer quadratischen Funktion) differenzierbar, und für alle $a > 0$ gilt

$$h'(a) = -e^{-a} (a^2 - 3) + e^{-a} \cdot 2a = -e^{-a} (a^2 - 2a - 3) = -e^{-a} (a-3)(a+1);$$

wegen

$$h'(a) = \underbrace{-e^{-a}}_{<0} \cdot \underbrace{(a-3)}_{\leq 0} \cdot \underbrace{(a+1)}_{>0} \geq 0$$

für alle $a \in]0; 3]$ ist h auf $]0; 3]$ monoton wachsend, und wegen

$$h'(a) = \underbrace{-e^{-a}}_{<0} \cdot \underbrace{(a-3)}_{\geq 0} \cdot \underbrace{(a+1)}_{>0} \leq 0$$

für alle $a \in [3; +\infty[$ ist h auf $[3; +\infty[$ monoton fallend, woraus sich

$$h(a) \leq h(3) = e^{-3} (3^2 - 3) = 6e^{-3} \quad \text{für alle } a > 0$$

ergibt. Zusammenfassend erhält man für alle $(x,y) \in D$ mit $(x,y) \neq (0,0)$ also

$$f(x,y) \stackrel[t=x]{a=x+y} = f(t, a-t) \leq f(a,0) = h(a) \leq h(3) = 6e^{-3}$$

mit

$$f(3, 0) = e^{-(3+0)} (3^2 + 0^2 + 3 \cdot 0 - 3) = e^{-3} \cdot 6 = 6 e^{-3};$$

folglich ist

$$6 e^{-3} = \max W = \sup W.$$

7.23 Die Einheitskreisscheibe

$$M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

ist eine sowohl abgeschlossene als auch beschränkte und damit kompakte Teilmenge von $\mathbb{R}^2$; darüber hinaus ist die Funktion

$$f : M \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = x^2 - x + 2y^2,$$

als Polynomfunktion insbesondere stetig. Nach dem Satz von Weierstraß besitzt damit die stetige Funktion f auf der kompakten Menge M eine globale Minimalstelle $(p_1, q_1) \in M$ und eine globale Maximalstelle $(p_2, q_2) \in M$, für alle $(x, y) \in M$ gilt also $f(p_1, q_1) \leq f(x, y) \leq f(p_2, q_2)$.

Die Polynomfunktion f ist insbesondere partiell differenzierbar, und für alle $(x, y) \in M$ gilt

$$\partial_1 f(x, y) = 2x - 1 \quad \text{und} \quad \partial_2 f(x, y) = 4y.$$

Damit kommen für globale Extremstellen $(p, q) \in M$ nur die beiden folgenden Fälle in Frage:

- Der Punkt (p, q) liegt auf dem Rand ∂M von M ; wir betrachten für die Punkte der Einheitskreislinie ∂M die Darstellung $(\cos \varphi, \sin \varphi)$ in Polarkoordinaten mit $\varphi \in [0; 2\pi]$ und erhalten

$$f(\cos \varphi, \sin \varphi) = \cos^2 \varphi - \cos \varphi + 2 \sin^2 \varphi.$$

Die differenzierbare Hilfsfunktion

$$h : [0; 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(\varphi) = \cos^2 \varphi - \cos \varphi + 2 \sin^2 \varphi,$$

kann ihre Extremwerte in den Randpunkten $\varphi = 0$ und $\varphi = 2\pi$ ihres Definitionsintervalls $[0; 2\pi]$ und auf $]0; 2\pi[$ in den Nullstellen ihrer Ableitung

$$\begin{aligned} h'(\varphi) &= 2 \cos \varphi \cdot (-\sin \varphi) - (-\sin \varphi) + 4 \sin \varphi \cdot \cos \varphi = \\ &= 2 \sin \varphi \cos \varphi + \sin \varphi = 2 \sin \varphi \cdot \left(\cos \varphi + \frac{1}{2} \right), \end{aligned}$$

also für $\sin \varphi = 0$ und damit in $\varphi = \pi$ oder für $\cos \varphi = -\frac{1}{2}$ und damit in $\varphi = \frac{2\pi}{3}$ oder $\varphi = \frac{4\pi}{3}$ annehmen; damit kommen für (p, q) die Punkte $(1, 0)$ und $(-1, 0)$ sowie $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\sqrt{3})$ und $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\sqrt{3})$ in Frage.

- Der Punkt (p, q) liegt im Innern $\overset{\circ}{M}$ von M ; dann ist aber (p, q) ein kritischer Punkt von f , es gilt also $\text{grad } f(p, q) = (0, 0)$, weswegen nur der Punkt $(\frac{1}{2}, 0)$ in Frage kommt.

Mit Hilfe der Wertetabelle

(p, q)	$(1, 0)$	$(-1, 0)$	$(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\sqrt{3})$	$(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\sqrt{3})$	$(\frac{1}{2}, 0)$
$f(p, q)$	0	2	$\frac{9}{4}$	$\frac{9}{4}$	$-\frac{1}{4}$

erkennt man, daß f in $(\frac{1}{2}, 0)$ das globale Minimum $-\frac{1}{4}$ sowie in $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\sqrt{3})$ und $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\sqrt{3})$ das globale Maximum $\frac{9}{4}$ besitzt.

7.24 Zur Bestimmung von Infimum und Supremum der gegebenen Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = (4y^2 - x^2) e^{-x^2 - y^2}$$

auf der abgeschlossenen Kreisscheibe

$$M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 2\}$$

mit dem Mittelpunkt $(0, 0)$ und dem Radius $\sqrt{2}$ bieten sich folgende Wege an:

- Für einen Punkt $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ betrachten wir seine Darstellung in Polarkoordinaten $(r \cos \varphi, r \sin \varphi)$ mit $r \in [0; \sqrt{2}]$ und $\varphi \in [0; 2\pi]$; dabei gilt

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) = \\ &= (4(r \sin \varphi)^2 - (r \cos \varphi)^2) e^{-(r \cos \varphi)^2 - (r \sin \varphi)^2} = \\ &= (4r^2 \sin^2 \varphi - r^2 \cos^2 \varphi) e^{-r^2(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi)} \stackrel{\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 1}{=} \\ &= (4 \sin^2 \varphi - \cos^2 \varphi) \cdot r^2 e^{-r^2} \stackrel{\cos^2 \varphi = 1 - \sin^2 \varphi}{=} \\ &= (5 \sin^2 \varphi - 1) \cdot r^2 e^{-r^2}, \end{aligned}$$

so daß wir die beiden Faktoren getrennt untersuchen können:

- Für die Hilfsfunktion

$$g : [0; 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(\varphi) = 5 \sin^2 \varphi - 1,$$

ergibt sich wegen $0 \leq \sin^2 \varphi \leq 1$ dann

$$g(0) = -1 \leq g(\varphi) \leq 4 = g(\frac{\pi}{2}) \quad \text{für alle } \varphi \in [0; 2\pi].$$

- Die Hilfsfunktion

$$h : [0; \sqrt{2}] \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(r) = r^2 e^{-r^2},$$

ist stetig und besitzt daher auf dem abgeschlossenen Definitionsintervall $[0; \sqrt{2}]$ nach dem Satz von Weierstraß ein globales Minimum und ein globales Maximum. Als Extrema der differenzierbaren Funktion h kommen neben den Randpunkten von $[0; \sqrt{2}]$, also $r = 0$ und $r = \sqrt{2}$, nur noch die Nullstellen ihrer Ableitung

$$h'(r) = 2r \cdot e^{-r^2} + r^2 (e^{-r^2}(-2r)) = 2r e^{-r^2} \cdot (1 - r^2),$$

im Innern $]0; \sqrt{2}[$ ihres Definitionsintervalls $[0; \sqrt{2}]$, also $r = 1$, in Frage. Wegen $h(0) = 0$, $h(\sqrt{2}) = 2e^{-2}$ und $h(1) = e^{-1}$ mit $0 < 2e^{-2} < e^{-1}$ ergibt sich

$$h(0) = 0 \leq h(r) \leq e^{-1} = h(1) \quad \text{für alle } r \in [0; \sqrt{2}].$$

Zusammenfassend erhalten wir wegen $f(x, y) = g(\varphi) \cdot h(r)$ demnach

$$-e^{-1} \leq f(x, y) \leq 4e^{-1}$$

für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$; dabei ergibt sich für $\varphi = 0$ und $r = 1$, also $(x, y) = (1, 0)$,

$$f(1, 0) = -e^{-1} \quad \text{und damit} \quad \inf f(M) = \min f(M) = -e^{-1},$$

sowie für $\varphi = \frac{\pi}{2}$ und $r = 1$, also $(x, y) = (0, 1)$,

$$f(0, 1) = 4e^{-1} \quad \text{und damit} \quad \sup f(M) = \max f(M) = 4e^{-1}.$$

• Die Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = (4y^2 - x^2) e^{-x^2 - y^2}$$

ist (als Produkt und Komposition von Polynomfunktionen und der Exponentialfunktion) stetig und besitzt daher nach dem Satz von Weierstraß auf der kompakten Kreisscheibe

$$M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 2\}$$

(mindestens) ein globales Minimum und ein globales Maximum; es gibt also $(a, b), (c, d) \in M$ mit

$$f(a, b) \leq f(x, y) \leq f(c, d) \quad \text{für alle} \quad (x, y) \in M,$$

und wir erhalten

$$\inf f(M) = \min f(M) = f(a, b) \quad \text{und} \quad \sup f(M) = \max f(M) = f(c, d).$$

Für die Lage dieser Extremstellen $(p, q) \in M$ gibt es nun die beiden folgenden Möglichkeiten:

- Der Punkt (p, q) liegt auf dem Rand ∂M von M ; wir betrachten für die Punkte (x, y) der Kreislinie ∂M die Darstellung $(\sqrt{2} \cos \varphi, \sqrt{2} \sin \varphi)$ in Polarkoordinaten mit $\varphi \in [0; 2\pi]$ und erhalten

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(\sqrt{2} \cos \varphi, \sqrt{2} \sin \varphi) = \\ &= \left(4 \left(\sqrt{2} \sin \varphi \right)^2 - \left(\sqrt{2} \cos \varphi \right)^2 \right) e^{-(\sqrt{2} \cos \varphi)^2 - (\sqrt{2} \sin \varphi)^2} = \\ &= (8 \sin^2 \varphi - 2 \cos^2 \varphi) e^{-2(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi)} \stackrel{\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 1}{=} \\ &= 2(4 \sin^2 \varphi - \cos^2 \varphi) e^{-2} \stackrel{\cos^2 \varphi = 1 - \sin^2 \varphi}{=} \\ &= 2(5 \sin^2 \varphi - 1) e^{-2}. \end{aligned}$$

Als Extremstellen der differenzierbaren Hilfsfunktion

$$h : [0; 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(\varphi) = 2(5 \sin^2 \varphi - 1) e^{-2},$$

kommen neben den Randpunkten des Definitionsintervalls $[0; 2\pi]$, also $\varphi = 0$ und $\varphi = 2\pi$ jeweils mit $(x, y) = (\sqrt{2}, 0)$, nur noch die Nullstellen ihrer Ableitung

$$h'(\varphi) = 2(10 \sin \varphi \cos \varphi) e^{-2} = 20e^{-2} \sin \varphi \cos \varphi$$

im Innern $]0; 2\pi[$ des Definitionsintervalls $[0; 2\pi]$, also $\varphi = \frac{\pi}{2}$ mit $(x, y) = (0, \sqrt{2})$, $\varphi = \pi$ mit $(x, y) = (-\sqrt{2}, 0)$ und $\varphi = \frac{3\pi}{2}$ mit $(x, y) = (0, -\sqrt{2})$.

- Der Punkt (p, q) liegt im Innern $\overset{\circ}{M}$ von M ; da aber f partiell differenzierbar mit

$$\begin{aligned}\partial_1 f(x, y) &= (-2x) \cdot e^{-x^2-y^2} + (4y^2 - x^2) \cdot (e^{-x^2-y^2} \cdot (-2x)) = \\ &= -2x e^{-x^2-y^2} \cdot (1 + 4y^2 - x^2)\end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}\partial_2 f(x, y) &= (8y) \cdot e^{-x^2-y^2} + (4y^2 - x^2) \cdot (e^{-x^2-y^2} \cdot (-2y)) = \\ &= -2y e^{-x^2-y^2} \cdot (-4 + 4y^2 - x^2)\end{aligned}$$

für alle $(x, y) \in M$ ist, muß (p, q) dann eine kritische Stelle von f sein. Aus

$$\partial_1 f(p, q) = -2p e^{-p^2-q^2} \cdot (1 + 4q^2 - p^2) = 0$$

folgt wegen $e^{-p^2-q^2} > 0$ schon

$$p = 0 \quad \text{oder} \quad p^2 = 1 + 4q^2;$$

im Falle $p = 0$ folgt dann aus

$$\partial_2 f(p, q) = -2q e^{-p^2-q^2} \cdot (-4 + 4q^2 - p^2) = 0$$

erneut wegen $e^{-p^2-q^2} > 0$ schon $q = 0$ oder $-4 + 4q^2 = 0$ bzw. $q^2 = 1$, also $q \in \{-1, 0, 1\}$, und im Falle $p^2 = 1 + 4q^2$ ist neben $e^{-p^2-q^2} > 0$ auch $-4 + 4q^2 - p^2 = -5 < 0$, so daß aus $\partial_2 f(p, q) = 0$ schon $q = 0$ und damit $p^2 = 1$, also $p \in \{-1, 1\}$ folgt. Damit kommen als Extremstellen (p, q) nur die fünf Punkte $(0; 0)$ sowie $(\pm 1; 0)$ und $(0; \pm 1)$ in Frage.

Mit Hilfe der Wertetabelle

$$\begin{array}{c|c|c|c|c} (p, q) & (\sqrt{2}, 0) & (0, \sqrt{2}) & (-\sqrt{2}, 0) & (0, -\sqrt{2}) \\ \hline f(p, q) & -2e^{-2} & 8e^{-2} & -2e^{-2} & 8e^{-2} \\ \\ \hline (p, q) & (0, 0) & (1, 0) & (0, 1) & (-1, 0) & (0, -1) \\ \hline f(p, q) & 0 & -e^{-1} & 4e^{-1} & -e^{-1} & 4e^{-1} \end{array}$$

erkennt man, daß f den minimalen Funktionswert $-e^{-1}$ in den Punkten $(a, b) = (\pm 1, 0)$ sowie den maximalen Funktionswert $4e^{-1}$ in den Punkten $(c, d) = (0, \pm 1)$ annimmt; es ist also

$$\inf f(M) = \min f(M) = -e^{-1} \quad \text{und} \quad \sup f(M) = \max f(M) = 4e^{-1}.$$

7.25 Die (als Polynomfunktion insbesondere) stetige Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = x^3 + 4y^3 - 3x - 3y,$$

besitzt auf der sowohl abgeschlossenen als auch beschränkten und damit kompakten Teilmenge

$$Q = [-1, 1] \times [-1, 1] \subseteq \mathbb{R}^2$$

nach dem Satz von Weierstraß (mindestens) eine globale Minimalstelle und (mindestens) eine globale Maximalstelle.

Da die Funktion f darüber hinaus partiell differenzierbar ist, wobei

$$\partial_1 f(x, y) = 3x^2 - 3 \quad \text{und} \quad \partial_2 f(x, y) = 12y^2 - 3$$

für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ und damit insbesondere

$$\partial_1 f(x, y) = 3(x^2 - 1) < 0$$

für alle Punkte $(x, y) \in \overset{\circ}{Q}$ im Innern $\overset{\circ}{Q} =]-1, 1[\times]-1, 1[$ von Q gilt, kommen für globale Extremstellen $(a, b) \in Q$ von f nur Punkte (a, b) auf dem Rand ∂Q des Quadrats Q in Frage:

- Für die Punkte $(-1, t)$ mit $t \in [-1, 1]$ der linken bzw. $(1, t)$ mit $t \in [-1, 1]$ der rechten Quadratseite gilt

$$f(\pm 1, t) = (\pm 1)^3 + 4t^3 - 3 \cdot (\pm 1) - 3t = 4t^3 - 3t \mp 2;$$

da die (als Polynomfunktion insbesondere differenzierbare) Hilfsfunktion

$$h_1 : [-1; 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad h_1(t) = 4t^3 - 3t \mp 2,$$

ihre Extrema nur in den beiden Randpunkten ihres Definitionsintervalls, also in $t = -1$ und $t = 1$, sowie in den Nullstellen ihrer Ableitung

$$h_1'(t) = 12t^2 - 3 = 12 \left(t^2 - \frac{1}{4} \right) = 12 \left(t + \frac{1}{2} \right) \left(t - \frac{1}{2} \right),$$

also in $t = -\frac{1}{2}$ und $t = \frac{1}{2}$ annehmen kann, kommen für (a, b) nur die Punkte $(\pm 1, -1)$, $(\pm 1, -\frac{1}{2})$, $(\pm 1, \frac{1}{2})$ und $(\pm 1, 1)$ in Frage.

- Für die Punkte $(t, -1)$ mit $t \in [-1, 1]$ der unteren bzw. $(t, 1)$ mit $t \in [-1, 1]$ der oberen Quadratseite gilt

$$f(t, \pm 1) = t^3 + 4 \cdot (\pm 1)^3 - 3t - 3 \cdot (\pm 1) = t^3 - 3t \pm 1;$$

da die (als Polynomfunktion insbesondere differenzierbare) Hilfsfunktion

$$h_2 : [-1; 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad h_2(t) = t^3 - 3t \pm 1,$$

ihre Extrema nur in den beiden Randpunkten ihres Definitionsintervalls, also in $t = -1$ und $t = 1$, die hier mit den Nullstellen ihrer Ableitung

$$h_2'(t) = 3t^2 - 3 = 3(t^2 - 1) = 3(t + 1)(t - 1),$$

zusammenfallen, annehmen kann, kommen für (a, b) nur die Punkte $(-1, \pm 1)$ und $(1, \pm 1)$ in Frage.

Mit Hilfe der Wertetabelle

(a, b)	$(-1, -1)$	$(-1, -\frac{1}{2})$	$(-1, \frac{1}{2})$	$(-1, 1)$	$(1, -1)$	$(1, -\frac{1}{2})$	$(1, \frac{1}{2})$	$(1, 1)$
$f(a, b)$	1	3	1	3	-3	-1	-3	-1

erkennt man, daß f den maximalen Funktionswert 3 in den Punkten $(-1, -\frac{1}{2})$ und $(-1, 1)$ sowie den minimalen Funktionswert -3 in den Punkten $(1, -1)$ und $(1, \frac{1}{2})$ annimmt.

7.26 Bei der gegebenen Menge

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < y < \frac{\pi}{2} \right\}$$

handelt es sich um den offenen, von der x -Achse $y = 0$ und der dazu parallelen Geraden $y = \frac{\pi}{2}$ begrenzten Streifen; zu betrachten ist hierauf die Funktion

$$h : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(x, y) = 2x \tan y - \left(\frac{x}{\cos y} \right)^2.$$

a) Für alle $(x, y) \in D$ gilt

$$\begin{aligned} h(x, y) &= 2x \tan y - \left(\frac{x}{\cos y} \right)^2 = 2x \cdot \frac{\sin y}{\cos y} - \frac{x^2}{\cos^2 y} = \\ &= \frac{x}{\cos^2 y} \cdot (2 \sin y \cos y - x) = \frac{x}{\cos^2 y} \cdot (\sin(2y) - x); \end{aligned}$$

damit besteht die Nullstellenmenge $N = \{(x, y) \in D \mid h(x, y) = 0\}$ von h genau aus denjenigen Punkten $(x, y) \in D$ mit

$$x = 0 \quad \text{oder} \quad x = \sin(2y),$$

wodurch sich die folgende Skizze ergibt:

b) Zur Bestimmung des Wertebereichs

$$h(D) = \{h(x, y) \mid (x, y) \in D\}$$

der Funktion h betrachten wir ihr Verhalten auf jeder im Definitionsbereich D liegenden, zur x -Achse parallelen Geraden $y = y_0$ mit $y_0 \in]0; \frac{\pi}{2}[$: wegen

$$h(x, y_0) = \frac{x}{\cos^2 y_0} \cdot (\sin(2y_0) - x)$$

für alle $x \in \mathbb{R}$ ist h dort eine quadratische Funktion mit den beiden Nullstellen $x_1 = 0$ und $x_2 = \sin(2y_0)$; da der Koeffizient $-\frac{1}{\cos^2 y_0}$ von x^2 negativ ist, stellt ihr Graph eine nach unten geöffnete Parabel mit dem Scheitel bei $x_0 = \frac{1}{2}(x_1 + x_2) = \frac{1}{2} \sin(2y_0)$ und

$$\begin{aligned} h(x_0, y_0) &= \frac{x_0}{\cos^2 y_0} \cdot (\sin(2y_0) - x_0) = \frac{\frac{1}{2} \sin(2y_0)}{\cos^2 y_0} \cdot \frac{1}{2} \sin(2y_0) = \\ &= \frac{\sin y_0 \cdot \cos y_0}{\cos^2 y_0} \cdot \sin y_0 \cdot \cos y_0 = \sin^2 y_0 \end{aligned}$$

dar, weswegen die Funktion h auf der Geraden $y = y_0$ genau die Werte in

$$W_{y_0} =]-\infty; \sin^2 y_0]$$

annimmt. Insgesamt ergibt sich damit

$$h(D) = \bigcup_{0 < y_0 < \frac{\pi}{2}} W_{y_0} = \bigcup_{0 < y_0 < \frac{\pi}{2}}]-\infty; \sin^2 y_0] =]-\infty; 1[;$$

dabei geht ein, daß die Funktion $\sin^2$ auf $]0; \frac{\pi}{2}[$ streng monoton wachsend mit $\lim_{y_0 \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sin^2 y_0 = 1$ ist.

7.27 a) Die gegebene Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = 2x^2 + y^2 - xy^2,$$

ist (als Polynomfunktion) zweimal stetig partiell differenzierbar, und für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ gilt

$$\partial_1 f(x, y) = 4x - y^2 \quad \text{und} \quad \partial_2 f(x, y) = 2y - 2xy$$

sowie

$$\partial_1 \partial_1 f(x, y) = 4 \quad \text{und} \quad \partial_2 \partial_2 f(x, y) = 2 - 2x$$

und

$$\partial_2 \partial_1 f(x, y) = -2y = \partial_1 \partial_2 f(x, y),$$

also

$$\text{grad } f(x, y) = (4x - y^2, 2y - 2xy)$$

und

$$\text{Hess } f(x, y) = \begin{pmatrix} 4 & -2y \\ -2y & 2 - 2x \end{pmatrix}.$$

Für eine kritische Stelle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ von f gilt $\text{grad } f(x, y) = (0, 0)$, also

$$4x - y^2 = 0 \quad \text{und} \quad 2y - 2xy = 0;$$

wegen

$$2y - 2xy = 0 \iff 2y(1 - x) = 0 \iff y = 0 \quad \text{oder} \quad x = 1$$

sowie

- im Falle $y = 0$

$$4x - y^2 = 0 \iff 4x = 0 \iff x = 0$$

- und im Falle $x = 1$

$$4x - y^2 = 0 \iff 4 - y^2 = 0 \iff y^2 = 4 \iff y = \pm 2$$

besitzt f genau die drei kritischen Stellen $(0, 0)$ sowie $(1, 2)$ und $(1, -2)$; nur diese kommen als lokale Extrema von f in Frage:

- Es gilt

$$\text{grad } f(0, 0) = (0, 0) \quad \text{und} \quad \text{Hess } f(0, 0) = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix};$$

damit besitzt $\text{Hess } f(0, 0)$ die beiden positiven Eigenwerte 4 und 2 und ist folglich positiv definit. Daher besitzt f in $(0, 0)$ ein lokales Minimum.

- Es gilt

$$\text{grad } f(1, 2) = (0, 0) \quad \text{und} \quad \text{Hess } f(1, 2) = \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ -4 & 0 \end{pmatrix};$$

damit besitzt $\text{Hess } f(1, 2)$ die negative Determinante -16 und ist folglich indefinit. Daher besitzt f in $(1, 2)$ einen Sattelpunkt, insbesondere also kein lokales Extremum.

- Es gilt

$$\text{grad } f(1, -2) = (0, 0) \quad \text{und} \quad \text{Hess } f(1, -2) = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 0 \end{pmatrix};$$

damit besitzt $\text{Hess } f(1, -2)$ die negative Determinante -16 und ist folglich indefinit. Daher besitzt f in $(1, -2)$ einen Sattelpunkt, insbesondere also kein lokales Extremum.

Damit besitzt f genau ein lokales Extremum, nämlich ein lokales Minimum in $(0, 0)$.

- b) Wegen

$$f(0, t) = 2 \cdot 0^2 + t^2 - 0 \cdot t^2 = t^2 \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} +\infty$$

ist f nicht nach oben beschränkt, besitzt also insbesondere kein globales Maximum, und wegen

$$f(2, t) = 2 \cdot 2^2 + t^2 - 2 \cdot t^2 = 8 - t^2 \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} -\infty$$

ist f nicht nach unten beschränkt, besitzt also insbesondere kein globales Minimum.

7.28 Für alle Punkte $(x, y) \in M$ des abgeschlossenen 1. Quadranten $M \subseteq \mathbb{R}^2$ gilt

$$\begin{aligned} f(x, y) &= e^{-(x+y)} (xy + x + y + 1) = e^{-x-y} (x(y+1) + (y+1)) = \\ &= e^{-x} e^{-y} (x+1)(y+1) = (e^{-x}(x+1)) \cdot (e^{-y}(y+1)); \end{aligned}$$

daher betrachten wir die (als Produkt einer Exponentialfunktion und einer linearen Funktion) insbesondere differenzierbare Funktion

$$h : [0; \infty[\rightarrow \mathbb{R}, \quad h(t) = e^{-t} (t + 1).$$

Wegen

$$h(t) = \underbrace{e^{-t}}_{>0} \cdot \underbrace{(t+1)}_{\geq 1} > 0$$

für alle $t \geq 0$ sowie

$$\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-t} (t + 1) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t + 1}{e^t} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{e^t} = 0$$

ergibt sich

$$f(x, y) = \underbrace{h(x)}_{>0} \cdot \underbrace{h(y)}_{>0} > 0$$

für alle $(x, y) \in M$ sowie

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x, x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\underbrace{h(x)}_{\rightarrow 0} \cdot \underbrace{h(x)}_{\rightarrow 0} \right) = 0 \cdot 0 = 0;$$

damit ist 0 die größte untere Schranke von W_f , also das Infimum von f . Des weiteren ist h wegen

$$h'(x) = (e^{-x} \cdot (-1)) \cdot (x + 1) + e^{-x} \cdot 1 = -x e^{-x} \leq 0$$

für alle $x \geq 0$ auf $[0; \infty[$ monoton fallend; folglich ist

$$0 < h(x) \leq h(0) = e^{-0} (0 + 1) = 1 \cdot 1 = 1$$

für alle $x \geq 0$ und damit

$$f(x, y) = h(x) \cdot h(y) \leq 1 \cdot 1 = 1$$

für alle $(x, y) \in M$ mit $f(0, 0) = h(0) \cdot h(0) = 1$; damit ist 1 das Maximum von W_f , insbesondere also das Supremum von f .

7.29 Die gegebene Funktion

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \frac{1}{x} - \frac{1}{y} + 16x - 4y,$$

mit

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq 0 \text{ und } y \neq 0\}$$

ist (als gebrochenrationale Funktion) zweimal stetig partiell differenzierbar, und für alle $(x, y) \in D$ gilt

$$\partial_1 f(x, y) = -\frac{1}{x^2} + 16 \quad \text{und} \quad \partial_2 f(x, y) = \frac{1}{y^2} - 4$$

sowie

$$\partial_1 \partial_1 f(x, y) = \frac{2}{x^3} \quad \text{und} \quad \partial_2 \partial_2 f(x, y) = -\frac{2}{y^3}$$

und

$$\partial_2 \partial_1 f(x, y) = 0 = \partial_1 \partial_2 f(x, y),$$

also

$$\text{grad } f(x, y) = \left(-\frac{1}{x^2} + 16, \frac{1}{y^2} - 4 \right)$$

und

$$\text{Hess } f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{2}{x^3} & 0 \\ 0 & -\frac{2}{y^3} \end{pmatrix}.$$

Für eine kritische Stelle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ von f gilt $\text{grad } f(x, y) = (0, 0)$; wegen

$$\partial_1 f(x, y) = 0 \iff \frac{1}{x^2} = 16 \iff x^2 = \frac{1}{16} \iff x = \pm \frac{1}{4}$$

und

$$\partial_2 f(x, y) = 0 \iff \frac{1}{y^2} = 4 \iff y^2 = \frac{1}{4} \iff y = \pm \frac{1}{2}$$

kommen als lokale Extrema von f nur die vier Punkte $(\frac{1}{4}, \frac{1}{2})$ und $(\frac{1}{4}, -\frac{1}{2})$ sowie $(-\frac{1}{4}, \frac{1}{2})$ und $(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{2})$ in Frage:

- Es gilt

$$\text{grad } f\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right) = (0, 0) \quad \text{und} \quad \text{Hess } f\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right) = \begin{pmatrix} 128 & 0 \\ 0 & -16 \end{pmatrix};$$

damit besitzt $\text{Hess } f\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$ den positiven Eigenwert 128 und den negativen Eigenwert -16 und ist folglich indefinit. Daher besitzt f in $(\frac{1}{4}, \frac{1}{2})$ einen Sattelpunkt, insbesondere also kein lokales Extremum.

- Es gilt

$$\text{grad } f\left(\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}\right) = (0, 0) \quad \text{und} \quad \text{Hess } f\left(\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}\right) = \begin{pmatrix} 128 & 0 \\ 0 & 16 \end{pmatrix};$$

damit besitzt $\text{Hess } f\left(\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}\right)$ die beiden positiven Eigenwerte 128 und 16 und ist folglich positiv definit. Daher besitzt f in $(\frac{1}{4}, -\frac{1}{2})$ ein (isoliertes) lokales Minimum.

- Es gilt

$$\text{grad } f\left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right) = (0, 0) \quad \text{und} \quad \text{Hess } f\left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right) = \begin{pmatrix} -128 & 0 \\ 0 & -16 \end{pmatrix};$$

damit besitzt $\text{Hess } f\left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$ die beiden negativen Eigenwerte -128 und -16 und ist folglich negativ definit. Daher besitzt f in $(-\frac{1}{4}, \frac{1}{2})$ ein (isoliertes) lokales Maximum.

- Es gilt

$$\text{grad } f\left(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}\right) = (0, 0) \quad \text{und} \quad \text{Hess } f\left(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}\right) = \begin{pmatrix} -128 & 0 \\ 0 & 16 \end{pmatrix};$$

damit besitzt $\text{Hess } f\left(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}\right)$ den negativen Eigenwert -128 und den positiven Eigenwert 16 und ist folglich indefinit. Daher besitzt f in $(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{2})$ einen Sattelpunkt, insbesondere also kein lokales Extremum.

Folglich besitzt die Funktion f genau zwei lokale Extrema, nämlich ein (isoliertes) lokales Minimum in $(\frac{1}{4}, -\frac{1}{2})$ sowie ein (isoliertes) lokales Maximum in $(-\frac{1}{4}, \frac{1}{2})$.

7.30 Die Definitionsmenge

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$$

ist die abgeschlossene Kreisscheibe um den Mittelpunkt $(0, 0)$ mit dem Radius 2; insbesondere ist D eine kompakte Teilmenge von $\mathbb{R}^2$. Damit besitzt die (als Polynomfunktion insbesondere) stetige Funktion

$$h : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(x, y) = 4xy - x^3y - xy^3,$$

nach dem Satz von Weierstraß mindestens ein globales Minimum und mindestens ein globales Maximum, es gibt also (a, b) und $(c, d) \in D$ mit

$$f(a, b) \leq f(x, y) \leq f(c, d)$$

für alle $(x, y) \in D$; für die Lage dieser Extremstellen $(p, q) \in D$ gibt es die folgenden beiden Möglichkeiten:

- (p, q) liegt auf dem Rand von D , also auf der Kreislinie $x^2 + y^2 = 4$ um $(0, 0)$ mit Radius 2, womit sich allerdings

$$h(p, q) = 4pq - p^3q - pq^3 = pq \left(4 - \underbrace{(p^2 + q^2)}_{=4} \right) = 0$$

ergibt.

- (p, q) liegt im Innern von D , also in der offenen Kreisscheibe $x^2 + y^2 < 4$; da aber h partiell differenzierbar mit

$$\partial_1 h(x, y) = 4y - 3x^2y - y^3 = y(4 - 3x^2 - y^2)$$

und

$$\partial_2 h(x, y) = 4x - x^3 - 3xy^2 = x(4 - x^2 - 3y^2)$$

für alle $(x, y) \in D$ ist, muß (p, q) dann eine kritische Stelle von h sein, so daß wegen

$$\partial_1 h(p, q) = 0 \iff q = 0 \quad \text{oder} \quad 3p^2 + q^2 = 4$$

und

$$\partial_2 h(p, q) = 0 \iff p = 0 \quad \text{oder} \quad p^2 + 3q^2 = 4$$

die folgende Fallunterscheidung motiviert wird:

- Es ist $q = 0$ und $p = 0$, also $(p, q) = (0, 0)$.
- Es ist $q = 0$ und $p^2 + 3q^2 = 4$, woraus sich $p^2 = 4$ und damit $p = \pm 2$ ergibt; die Punkte $(p, q) = (\pm 2, 0)$ liegen allerdings auf dem Rand und damit nicht im Innern von D .
- Es ist $3p^2 + q^2 = 4$ und $p = 0$, woraus sich $q^2 = 4$ und damit $q = \pm 2$ ergibt; die Punkte $(p, q) = (0, \pm 2)$ liegen allerdings auf dem Rand und damit nicht im Innern von D .

- Es ist $3p^2 + q^2 = 4$ und $p^2 + 3q^2 = 4$, woraus sich $p^2 = 1$ und $q^2 = 1$ und damit $p = \pm 1$ und $q = \pm 1$, also für (p, q) die Punkte $(1, 1)$, $(1, -1)$, $(-1, 1)$ und $(-1, -1)$ ergibt.

Der Vergleich der Funktionwerte

(p, q)	$\in \partial D$	$(0, 0)$	$(1, 1)$	$(1, -1)$	$(-1, 1)$	$(-1, -1)$
$h(p, q)$		0	2	-2	-2	2

zeigt, daß die Funktion h in Punkten $(1, 1)$ und $(-1, -1)$ ihr Maximum 2 sowie in den Punkten $(1, -1)$ und $(-1, 1)$ ihr Minimum -2 annimmt.

7.31 Die Definitionsmenge

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -\pi \leq x \leq \pi \text{ und } 0 \leq y \leq \pi\} = [-\pi; \pi] \times [0; \pi]$$

ist das abgeschlossene Rechteck mit den Eckpunkten $(-\pi; 0)$, $(\pi; 0)$, (π, π) und $(-\pi, \pi)$; insbesondere ist D eine kompakte Teilmenge von $\mathbb{R}^2$. Damit besitzt die (als Summe zweier trigonometrischer Funktionen insbesondere) stetige Funktion

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \cos x + \sin y,$$

nach dem Satz von Weierstraß mindestens ein globales Minimum und mindestens ein globales Maximum, es gibt also (a, b) und $(c, d) \in D$ mit

$$f(a, b) \leq f(x, y) \leq f(c, d)$$

für alle $(x, y) \in D$; für die Lage dieser Extremstellen $(p, q) \in D$ gibt es die folgenden beiden Möglichkeiten:

- (p, q) liegt auf dem Rand von D ; wegen

$$f(t, 0) = f(t, \pi) = \cos t \quad \text{für alle } t \in [-\pi; \pi]$$

und

$$f(-\pi, t) = f(\pi, t) = -1 + \sin t \quad \text{für alle } t \in [0; \pi]$$

kommen hierfür nur die Punkte $(-\pi, 0)$, $(0, 0)$, $(\pi, 0)$, $(-\pi, \pi)$, $(0, \pi)$, (π, π) sowie $(-\pi, \frac{\pi}{2})$ und $(\pi, \frac{\pi}{2})$ in Frage.

- (p, q) liegt im Innern von D ; da aber f partiell differenzierbar mit

$$\text{grad } f(x, y) = (-\sin x, \cos y) \quad \text{für alle } (x, y) \in]-\pi; \pi[\times]0; \pi[$$

ist, muß (p, q) dann eine kritische Stelle von f sein, weswegen hier nur der Punkt $(0, \frac{\pi}{2})$ in Frage kommt.

Der Vergleich der Funktionwerte

$f(-\pi, \pi) = -1$	$f(0, \pi) = 1$	$f(\pi, \pi) = -1$
$f(-\pi, \frac{\pi}{2}) = 0$	$f(0, \frac{\pi}{2}) = 2$	$f(\pi, \frac{\pi}{2}) = 0$
$f(-\pi, 0) = -1$	$f(0, 0) = 1$	$f(\pi, 0) = -1$

zeigt, daß f in Eckpunkten $(-\pi; 0)$, $(\pi; 0)$, (π, π) und $(-\pi, \pi)$ von D globale Minimalstellen sowie im Mittelpunkt $(0, \frac{\pi}{2})$ eine globale Maximalstelle besitzt.

7.32 a) Die auf ganz $\mathbb{R}^2$ definierte und (als Polynomfunktion) beliebig oft stetig partiell differenzierbare Funktion

$$f_c : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_c(x, y) = x^2 - 2xy + 4y^2 - 12y + c,$$

kann lokale Extrema nur in ihren kritischen Punkten annehmen; wegen

$$\partial_1 f_c(x, y) = 2x - 2y \quad \text{und} \quad \partial_2 f_c(x, y) = -2x + 8y - 12,$$

also

$$\text{grad } f_c(x, y) = (2x - 2y, -2x + 8y - 12)$$

für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ kommt hierfür nur ein Punkt $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ mit

$$2x - 2y = 0 \quad \text{und} \quad -2x + 8y - 12 = 0,$$

also $x = y$ und damit $y = 2$ in Frage. Der Punkt $(2, 2)$ ist nun wegen $\text{grad } f_c(2, 2) = (0, 0)$ ein kritischer Punkt von f_c , und die Hessematrix

$$A = \text{Hess } f_c(x, y) = \begin{pmatrix} \partial_1 \partial_1 f_c(x, y) & \partial_1 \partial_2 f_c(x, y) \\ \partial_2 \partial_1 f_c(x, y) & \partial_2 \partial_2 f_c(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 8 \end{pmatrix}$$

ist wegen

$$\det(A) = 2 \cdot 8 - (-2)^2 = 12 > 0 \quad \text{und} \quad \text{Spur}(A) = 2 + 8 = 10 > 0$$

positiv definit; folglich besitzt f_c in $(2, 2)$ ein (isoliertes) lokales Minimum.

b) Wegen

$$\begin{aligned} f_c(x, y) &= x^2 - 2xy + 4y^2 - 12y + c \\ &= (x - y)^2 + 3y^2 - 12y + c \\ &= (x - y)^2 + 3(y^2 - 4y + 4) - 12 + c \\ &= \underbrace{(x - y)^2}_{\geq 0} + 3 \underbrace{(y - 2)^2}_{\geq 0} + (c - 12) \geq c - 12 \end{aligned}$$

für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ gilt $W_c \subseteq [c - 12; +\infty[$. Wegen

$$f_c(t, t) = 3(t - 2)^2 + (c - 12)$$

für alle $t \in \mathbb{R}$ ist der Graph G_{f_c} von f_c auf der Winkelhalbierenden des 1. und 3. Quadranten eine nach oben geöffnete Parabel mit dem Scheitel $(2, c - 12)$; damit ist auch $[c - 12; \infty[\subseteq W_c$. Insgesamt ergibt sich also

$$W_c = [c - 12; +\infty[.$$

7.33 Die Polynomfunktion

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = 6x^2y - 5x^2 + 2x - 2y^3,$$

ist beliebig oft stetig partiell differenzierbar, und für $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ gilt

$$\partial_1 f(x, y) = 12xy - 10x + 2 \quad \text{und} \quad \partial_2 f(x, y) = 6x^2 - 6y^2$$

und damit

$$\text{grad } f(x, y) = (12xy - 10x + 2, 6x^2 - 6y^2)$$

sowie

$$\partial_1 \partial_1 f(x, y) = 12y - 10 \quad \text{und} \quad \partial_2 \partial_2 f(x, y) = -12y \quad \text{sowie}$$

$$\partial_2 \partial_1 f(x, y) = 12x = \partial_1 \partial_2 f(x, y)$$

und damit

$$\text{Hess } f(x, y) = \begin{pmatrix} 12y - 10 & 12x \\ 12x & -12y \end{pmatrix}.$$

Für einen kritischen Punkt $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ von f gilt $\text{grad } f(x, y) = (0, 0)$, also

$$12xy - 10x + 2 = 0 \quad \text{und} \quad 6x^2 - 6y^2 = 0;$$

wegen $6(x - y)(x + y) = 0$ ist also $x = y$ oder $x = -y$:

- Im Falle $x = y$ folgt $12x^2 - 10x + 2 = 0$, also $6x^2 - 5x + 1 = 0$, und damit

$$x_{1,2} = \frac{1}{12} \left(5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \cdot 6 \cdot 1} \right) = \frac{5 \pm 1}{12},$$

also $x_1 = \frac{1}{2}$ und $x_2 = \frac{1}{3}$.

- Im Falle $x = -y$ folgt $-12x^2 - 10x + 2 = 0$, also $6x^2 + 5x - 1 = 0$, und damit

$$x_{3,4} = \frac{1}{12} \left(-5 \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \cdot 6 \cdot (-1)} \right) = \frac{-5 \pm 7}{12},$$

also $x_3 = \frac{1}{6}$ und $x_4 = -1$.

Die Probe bestätigt, daß die gefundenen Kandidaten $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ und $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ sowie $(\frac{1}{6}, -\frac{1}{6})$ und $(-1, 1)$ tatsächlich kritische Punkte von f sind; dabei gilt:

- Die Matrix $A_1 = \text{Hess } f(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \begin{pmatrix} -4 & 6 \\ 6 & -6 \end{pmatrix}$ ist wegen $\det A_1 = -12 < 0$ indefinit; damit ist $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ein Sattelpunkt von f .
- Die Matrix $A_2 = \text{Hess } f(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}) = \begin{pmatrix} -6 & 4 \\ 4 & -4 \end{pmatrix}$ ist wegen $\det A_2 = 8 > 0$ und $\text{Spur } A_2 = -10 < 0$ negativ definit; damit ist $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ ein lokales Maximum von f .
- Die Matrix $A_3 = \text{Hess } f(\frac{1}{6}, -\frac{1}{6}) = \begin{pmatrix} -12 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ ist wegen $\det A_3 = -28 < 0$ indefinit; damit ist $(\frac{1}{6}, -\frac{1}{6})$ ein Sattelpunkt von f .
- Die Matrix $A_4 = \text{Hess } f(-1, 1) = \begin{pmatrix} 2 & -12 \\ -12 & -12 \end{pmatrix}$ ist wegen $\det A_4 = -168 < 0$ indefinit; damit ist $(-1, 1)$ ein Sattelpunkt von f .

Zur Bestimmung des Wertebereichs W_f der Funktion f betrachten wir deren Verhalten auf der y -Achse; wegen $f(0, t) = -2t^3$ für alle $t \in \mathbb{R}$ ergibt sich schließlich der Wertebereich $W_f = \mathbb{R}$.

7.34 Die Menge

$$M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y - 1 \leq 0\}$$

ist das von den Geraden $x = 0$, $y = 0$ und $y = 1 - x$ begrenzte abgeschlossene Dreieck mit den Eckpunkten $(0; 0)$, $(1; 0)$ und $(0; 1)$ und damit insbesondere eine kompakte Teilmenge des $\mathbb{R}^2$. Folglich besitzt die (als Polynomfunktion) insbesondere stetige Funktion

$$f : M \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = x y (x + y - 1),$$

nach dem Satz von Weierstraß auf dem Kompaktum M (mindestens) ein globales Minimum und (mindestens) ein globales Maximum. Dabei gilt für alle $(x, y) \in M$

$$f(x, y) = \underbrace{x}_{\geq 0} \cdot \underbrace{y}_{\geq 0} \cdot \underbrace{(x + y - 1)}_{\leq 0} \leq 0$$

mit

$$f(x, y) = 0 \iff x = 0 \quad \text{oder} \quad y = 0 \quad \text{oder} \quad y = 1 - x;$$

folglich besitzt die Funktion f genau in den Randpunkten von M ihre globalen Maximalstellen, und es gilt

$$\sup f(M) = 0.$$

Eine globale Minimalstelle $(p, q) \in M$ von f muß demnach im Innern

$$\overset{\circ}{M} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y > 0, x + y - 1 < 0\}$$

des Dreiecks M liegen; da f (als Polynomfunktion) insbesondere partiell differenzierbar ist, kommen dabei hierfür nur kritische Stellen von f in Frage. Für alle $(x, y) \in \overset{\circ}{M}$ gilt

$$f(x, y) = x y (x + y - 1) = x^2 y + x y^2 - x y$$

und damit

$$\partial_1 f(x, y) = 2x y + y^2 - y \quad \text{und} \quad \partial_2 f(x, y) = x^2 + 2x y - x,$$

weswegen wir

$$\partial_1 f(x, y) = 0 \iff (2x + y - 1)y = 0 \underset{y > 0}{\iff} 2x + y = 1$$

und

$$\partial_2 f(x, y) = 0 \iff (x + 2y - 1)x = 0 \underset{x > 0}{\iff} x + 2y = 1$$

erhalten. Für ein globales Minimum $(p, q) \in M$ von f muß also sowohl $2p + q = 1$ als auch $p + 2q = 1$, also $p = 1 - 2q$ und damit $2(1 - 2q) + q = 1$ bzw. $2 - 3q = 1$, und schließlich $q = \frac{1}{3}$ und $p = \frac{1}{3}$ gelten; somit ergibt sich

$$\inf f(M) = f\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} - 1\right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{27}.$$

7.35 Das Rechteck

$$R = [-1, 1] \times [0, 2\pi]$$

ist eine sowohl abgeschlossene als auch beschränkte und damit kompakte Teilmenge von $\mathbb{R}^2$; darüber hinaus ist die Funktion

$$f : R \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = x + e^x \cos y,$$

als Summe und Produkt einer linearen Funktion sowie der Exponentialfunktion und des Cosinus insbesondere stetig. Nach dem Satz von Weierstraß besitzt damit die stetige Funktion f auf der kompakten Menge R (mindestens) eine globale Minimalstelle und (mindestens) eine globale Maximalstelle.

Da die Funktion f darüber hinaus partiell differenzierbar ist, wobei

$$\partial_1 f(x, y) = 1 + e^x \cos y \quad \text{und} \quad \partial_2 f(x, y) = -e^x \sin y$$

für alle $(x, y) \in R$ gilt, kommen für globale Extremstellen $(a, b) \in R$ von f nur die beiden Fälle in Frage:

- Der Punkt (a, b) liegt auf dem Rand ∂R von R ; wir betrachten die vier Rechtecksseiten und greifen dabei auf bekannte Eigenschaften der Exponentialfunktion sowie des Cosinus zurück:

- Für die Punkte $(-1, t)$ mit $t \in [0, 2\pi]$ der linken Rechtecksseite gilt

$$f(-1, t) = -1 + e^{-1} \cos t;$$

damit kommen für (a, b) nur die Punkte $(-1, 0)$, $(-1, \pi)$ und $(-1, 2\pi)$ in Frage.

- Für die Punkte $(1, t)$ mit $t \in [0, 2\pi]$ der rechten Rechtecksseite gilt

$$f(1, t) = 1 + e \cos t;$$

damit kommen für (a, b) nur die Punkte $(1, 0)$, $(1, \pi)$ und $(1, 2\pi)$ in Frage.

- Für die Punkte $(t, 0)$ bzw. $(t, 2\pi)$ mit $t \in [-1, 1]$ der unteren bzw. oberen Rechtecksseite gilt

$$f(t, 0) = t + e^t = f(t, 2\pi);$$

da dieser Ausdruck in t streng monoton wachsend ist, kommen für (a, b) nur die Punkte $(-1, 0)$ und $(1, 0)$ bzw. $(-1, 2\pi)$ und $(1, 2\pi)$ in Frage.

- Der Punkt (a, b) liegt im Innern

$$\overset{\circ}{R} =]-1, 1[\times]0, 2\pi[$$

von R ; dann ist aber (a, b) schon ein kritischer Punkt von f , es gilt also $\text{grad } f(a, b) = (0, 0)$. Aus

$$\partial_2 f(a, b) = -e^a \sin b = 0$$

folgt zunächst $\sin b = 0$, also $b = \pi$, woraus sich mit

$$\partial_1 f(a, b) = 1 + e^a \cos b \underset{b=\pi}{=} 1 - e^a = 0$$

dann $e^a = 1$, also $a = 0$, ergibt; hier ist damit $(a, b) = (0, \pi)$.

Mit Hilfe der Wertetabelle

(a, b)	$(-1, 0)$	$(-1, \pi)$	$(-1, 2\pi)$	$(1, 0)$	$(1, \pi)$	$(1, 2\pi)$	$(0, \pi)$
$f(a, b)$	$-1 + \frac{1}{e}$	$-1 - \frac{1}{e}$	$-1 + \frac{1}{e}$	$1 + e$	$1 - e$	$1 + e$	-1

erkennt man wegen

$$1 - e < -1 - \frac{1}{e} < -1 < -1 + \frac{1}{e} < 1 + e,$$

daß f in $(1, \pi)$ eine globale Minimalstelle sowie in $(1, 0)$ und $(1, 2\pi)$ globale Maximalstellen besitzt.

7.36 Für alle $(x, y) \in D$ gilt $x^2 + y^2 \leq 1$ und damit

$$\begin{aligned} f(x, y) &= x^4 + y^4 + 2x^2y^2 + 2x^2 - 2y^2 + 1 \\ &= (x^4 + 2x^2y^2 + y^4) + (2x^2 + 2y^2) - 4y^2 + 1 \\ &= \underbrace{(x^2 + y^2)^2}_{\leq 1} + 2 \cdot \underbrace{(x^2 + y^2)}_{\leq 1} + \underbrace{(-4y^2)}_{\leq 0} + 1 \leq 1^2 + 2 \cdot 1 + 0 + 1 = 4 \end{aligned}$$

mit

$$\begin{aligned} f(x, y) = 4 &\iff \underbrace{(x^2 + y^2)^2}_{\leq 1} + 2 \cdot \underbrace{(x^2 + y^2)}_{\leq 1} + \underbrace{(-4y^2)}_{\leq 0} + 1 = 4 \\ &\iff x^2 + y^2 = 1 \quad \text{und} \quad -4y^2 = 0 \\ &\iff x^2 = 1 \quad \text{und} \quad y^2 = 0 \\ &\iff x = \pm 1 \quad \text{und} \quad y = 0. \end{aligned}$$

Damit nimmt die gegebene Funktion f auf der kompakten Einheitskreisscheibe D ihren maximalen Wert 4 genau in den beiden Punkten $(-1; 0)$ und $(1; 0)$ an.

7.37 a) Die Einheitskreisscheibe

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

ist eine sowohl abgeschlossene als auch beschränkte und damit kompakte Teilmenge von $\mathbb{R}^2$; darüber hinaus ist die Funktion

$$f : E \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = x^3 - 3xy^2,$$

als Polynomfunktion insbesondere stetig. Nach dem Satz von Weierstraß besitzt damit die stetige Funktion f auf der kompakten Menge E eine globale Minimalstelle $(p_1, q_1) \in E$ und eine globale Maximalstelle $(p_2, q_2) \in E$, für alle $(x, y) \in E$ gilt also $f(p_1, q_1) \leq f(x, y) \leq f(p_2, q_2)$.

b) Die Polynomfunktion f ist insbesondere partiell differenzierbar, und für alle $(x, y) \in E$ gilt

$$\partial_1 f(x, y) = 3x^2 - 3y^2 \quad \text{und} \quad \partial_2 f(x, y) = -6xy.$$

Damit kommen für globale Extremstellen $(a, b) \in E$ nur die beiden folgenden Fälle in Frage:

- Der Punkt (a, b) liegt auf dem Rand ∂E von E ; wir betrachten für die Punkte der Einheitskreislinie ∂E die Darstellung $(\cos \varphi, \sin \varphi)$ in Polarkoordinaten mit $\varphi \in [0; 2\pi]$ und erhalten

$$f(\cos \varphi, \sin \varphi) = \cos^3 \varphi - 3 \cos \varphi \underbrace{\sin^2 \varphi}_{=1-\cos^2 \varphi} = 4 \cos^3 \varphi - 3 \cos \varphi.$$

Die differenzierbare Hilfsfunktion

$$h : [0; 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(\varphi) = 4 \cos^3 \varphi - 3 \cos \varphi,$$

kann ihre Extremwerte in den Randpunkten $\varphi = 0$ und $\varphi = 2\pi$ ihres Definitionsintervalls oder in den Nullstellen ihrer Ableitung

$$h'(\varphi) = 4 (3 \cos^2 \varphi \cdot (-\sin \varphi)) - 3(-\sin \varphi) = -12 \sin \varphi \left(\cos^2 \varphi - \frac{1}{4} \right),$$

also für $\sin \varphi = 0$ oder $\cos \varphi = \pm \frac{1}{2}$ annehmen; damit kommen für φ nur die Werte $0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$ und 2π , also für (a, b) die Punkte $(\pm 1; 0)$ sowie $(\frac{1}{2}; \pm \frac{1}{2}\sqrt{3})$ und $(-\frac{1}{2}; \pm \frac{1}{2}\sqrt{3})$ in Frage.

- Der Punkt (a, b) liegt im Innern $\overset{\circ}{E}$ von E ; dann ist aber (a, b) ein kritischer Punkt von f , es gilt also $\text{grad } f(a, b) = (0, 0)$. Aus $\partial_1 f(a, b) = 3a^2 - 3b^2 = 0$ folgt zunächst $a^2 = b^2$, also $a = \pm b$, woraus sich mit $\partial_2 f(a, b) = -6ab = 0$ dann $\mp 6b^2 = 0$, also $b = 0$ und $a = 0$, ergibt; hier ist damit $(a, b) = (0, 0)$.

Mit Hilfe der Wertetabelle

(a, b)	$(1; 0)$	$(-1; 0)$	$(\frac{1}{2}; \pm \frac{1}{2}\sqrt{3})$	$(-\frac{1}{2}; \pm \frac{1}{2}\sqrt{3})$	$(0; 0)$
$f(a, b)$	1	-1	-1	1	0

erkennt man, daß f in $(-1, 0)$ sowie $(\frac{1}{2}; \pm \frac{1}{2}\sqrt{3})$ globale Minimalstellen sowie in $(1, 0)$ sowie $(-\frac{1}{2}; \pm \frac{1}{2}\sqrt{3})$ globale Maximalstellen besitzt.

7.38 Die Einheitskreisscheibe

$$M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

ist eine sowohl abgeschlossene als auch beschränkte und damit kompakte Teilmenge von $\mathbb{R}^2$; darüber hinaus ist die Funktion

$$f : M \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = x^2 + y^2 + x + y,$$

als Polynomfunktion insbesondere stetig. Nach dem Satz von Weierstraß besitzt damit die stetige Funktion f auf der kompakten Menge M eine globale Minimalstelle $(p_1, q_1) \in M$ und eine globale Maximalstelle $(p_2, q_2) \in M$, für alle $(x, y) \in M$ gilt also $f(p_1, q_1) \leq f(x, y) \leq f(p_2, q_2)$.

Die Polynomfunktion f ist insbesondere partiell differenzierbar, und für alle $(x, y) \in M$ gilt

$$\partial_1 f(x, y) = 2x + 1 \quad \text{und} \quad \partial_2 f(x, y) = 2y + 1.$$

Damit kommen für globale Extremstellen $(a, b) \in M$ nur die beiden folgenden Fälle in Frage:

- Der Punkt (a, b) liegt auf dem Rand ∂M von M ; wir betrachten für die Punkte der Einheitskreislinie ∂M die Darstellung $(\cos \varphi, \sin \varphi)$ in Polarkoordinaten mit $\varphi \in [0; 2\pi]$ und erhalten

$$f(\cos \varphi, \sin \varphi) = \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi + \cos \varphi + \sin \varphi = 1 + \cos \varphi + \sin \varphi.$$

Die differenzierbare Hilfsfunktion

$$h : [0; 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(\varphi) = 1 + \cos \varphi + \sin \varphi,$$

kann ihre Extremwerte in den Randpunkten $\varphi = 0$ und $\varphi = 2\pi$ ihres Definitionsintervalls oder in den Nullstellen ihrer Ableitung

$$h'(\varphi) = -\sin \varphi + \cos \varphi,$$

also für $\sin \varphi = \cos \varphi$ und damit in $\frac{\pi}{4}$ und $\frac{5\pi}{4}$ annehmen; damit kommen für (a, b) die Punkte $(1; 0)$ sowie $(\frac{1}{2}\sqrt{2}; \frac{1}{2}\sqrt{2})$ und $(-\frac{1}{2}\sqrt{2}; -\frac{1}{2}\sqrt{2})$ in Frage.

- Der Punkt (a, b) liegt im Innern $\overset{\circ}{M}$ von M ; dann ist aber (a, b) ein kritischer Punkt von f , es gilt also $\text{grad } f(a, b) = (0, 0)$, weswegen nur der Punkt $(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{2})$ in Frage kommt.

Mit Hilfe der Wertetabelle

(a, b)	$(1; 0)$	$(\frac{1}{2}\sqrt{2}; \frac{1}{2}\sqrt{2})$	$(-\frac{1}{2}\sqrt{2}; -\frac{1}{2}\sqrt{2})$	$(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{2})$
$f(a, b)$	2	$1 + \sqrt{2}$	$1 - \sqrt{2}$	$-\frac{1}{2}$

erkennt man, daß f in $(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{2})$ das globale Minimum sowie in $(\frac{1}{2}\sqrt{2}; \frac{1}{2}\sqrt{2})$ das globale Maximum besitzt, und es ist

$$\inf_{(x,y) \in M} f(x, y) = -\frac{1}{2} \quad \text{und} \quad \sup_{(x,y) \in M} f(x, y) = 1 + \sqrt{2}.$$

7.39 a) Die gegebene Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2 - 2y^2 + 4xy,$$

ist als Polynomfunktion beliebig oft stetig partiell differenzierbar, und für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ gilt

$$\partial_1 f(x, y) = 4x^3 - 4x + 4y \quad \text{und} \quad \partial_2 f(x, y) = 4y^3 - 4y + 4x$$

sowie

$$\partial_1 \partial_1 f(x, y) = 12x^2 - 4 \quad \text{und} \quad \partial_2 \partial_2 f(x, y) = 12y^2 - 4$$

und

$$\partial_1 \partial_2 f(x, y) = 4 = \partial_2 \partial_1 f(x, y).$$

Für einen kritischen Punkt $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ gilt $\text{grad } f(x, y) = (0, 0)$, also

$$\partial_1 f(x, y) = 4x^3 - 4x + 4y = 0 \quad \text{und} \quad \partial_2 f(x, y) = 4y^3 - 4y + 4x = 0,$$

woraus sich zunächst

$$(4x^3 - 4x + 4y) + (4y^3 - 4y + 4x) = 0,$$

also $4(x^3 + y^3) = 0$, und damit $y^3 = -x^3 = (-x)^3$, also $y = -x$, ergibt; folglich ist

$$0 = \partial_1 f(x, y) = 4x^3 - 8x = 4x(x^2 - 2) = 4x(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2}),$$

woraus man schließlich $x_1 = 0$ (mit $y_1 = 0$) sowie $x_2 = \sqrt{2}$ (mit $y_2 = -\sqrt{2}$) und $x_3 = -\sqrt{2}$ (mit $y_3 = \sqrt{2}$) erhält. Wir untersuchen das Verhalten von f in den drei ermittelten Punkten:

- Es ist $\text{grad } f(0; 0) = (0, 0)$ und $\text{Hess } f(0; 0) = \begin{pmatrix} -4 & 4 \\ 4 & -4 \end{pmatrix}$; da die Hessematrix $\text{Hess } f(0; 0)$ die Determinante 0 besitzt, ist darüber keine Aussage hinsichtlich des Verhaltens von f im Punkte $(0; 0)$ möglich. Wir untersuchen daher die Funktionswerte $f(x, y)$ auf den beiden Winkelhalbierenden; dabei ist

$$f(t; t) = t^4 + t^4 - 2t^2 - 2t^2 + 4t^2 = 2t^4 > 0 = f(0, 0)$$

für alle $t \neq 0$ sowie

$$f(t; -t) = t^4 + t^4 - 2t^2 - 2t^2 - 4t^2 = 2t^2(t^2 - 4) < 0 = f(0, 0)$$

für alle $0 < |t| < 2$. Damit nimmt f auf jeder (noch so kleinen) Kreisscheibe um dem Mittelpunkt $(0; 0)$ sowohl positive als auch negative Funktionswerte an und kann daher im Punkt $(0; 0)$ kein Extremum besitzen.

- Es ist $\text{grad } f(\sqrt{2}; -\sqrt{2}) = (0, 0)$ und $\text{Hess } f(\sqrt{2}; -\sqrt{2}) = \begin{pmatrix} 20 & 4 \\ 4 & 20 \end{pmatrix}$; da die Hessematrix $\text{Hess } f(\sqrt{2}; -\sqrt{2})$ die positive Determinante 384 und die positive Spur 40 besitzt, ist sie positiv definit, und f besitzt in $(\sqrt{2}; -\sqrt{2})$ ein lokales Minimum.
- Es ist $\text{grad } f(-\sqrt{2}; \sqrt{2}) = (0, 0)$ und $\text{Hess } f(-\sqrt{2}; \sqrt{2}) = \begin{pmatrix} 20 & 4 \\ 4 & 20 \end{pmatrix}$; damit ist die Hessematrix $\text{Hess } f(-\sqrt{2}; \sqrt{2})$ wie eben positiv definit, und f besitzt auch in $(-\sqrt{2}; \sqrt{2})$ ein lokales Minimum.

- b) Nach dem Satz von Weierstraß nimmt die als Polynomfunktion insbesondere stetige Funktion $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ auf der kompakten Einheitskreisscheibe

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

ein globales Minimum und ein globales Maximum an; für die globale Maximalstelle (a, b) von f auf E gilt also

$$f(x, y) \leq f(a, b) \quad \text{für jedes } (x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ mit } x^2 + y^2 \leq 1.$$

Unter der Annahme, der Punkt (a, b) liege im Innern $\overset{\circ}{E}$ von E , muß (a, b) ein kritischer Punkt von f sein, wofür aber nach a) nur $(0; 0)$ in Frage kommt;

nachdem f aber in $(0; 0)$ kein lokales Extremum besitzt, kann f dort auch nicht sein globales Maximum auf E annehmen. Folglich muß der Punkt (a, b) auf dem Rand ∂E von E liegen und genügt demnach der Kreisgleichung $a^2 + b^2 = 1$.

- 7.40 a) Für einen Punkt $(x; y) \in \mathbb{R}^2$ betrachten wir seine Darstellung in Polarkoordinaten $(r \cos \varphi; r \sin \varphi)$ mit $r \in \mathbb{R}_0^+$ und $\varphi \in [0; 2\pi]$; dabei gilt

$$\begin{aligned} f(x; y) &= f(r \cos \varphi; r \sin \varphi) = \\ &= e^{-((r \cos \varphi)^2 + (r \sin \varphi)^2)} \left((r \cos \varphi)^2 - 2(r \sin \varphi)^2 \right) \stackrel{\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 1}{=} \\ &= e^{-r^2} (r^2 \cos^2 \varphi - 2r^2 \sin^2 \varphi) \stackrel{\sin^2 \varphi = 1 - \cos^2 \varphi}{=} \left(e^{-r^2} r^2 \right) (3 \cos^2 \varphi - 2), \end{aligned}$$

so daß wir die beiden Faktoren getrennt untersuchen können:

- Die Hilfsfunktion

$$g : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(r) = e^{-r^2} r^2,$$

ist beliebig oft differenzierbar, und für alle $r \geq 0$ gilt

$$g'(r) = \left(e^{-r^2} (-2r) \right) \cdot r^2 + e^{-r^2} \cdot (2r) = 2r e^{-r^2} \cdot (1 - r^2);$$

wegen $g'(r) > 0$ für alle $r \in]0; 1[$ ist g auf $[0; 1]$ streng monoton wachsend, und wegen $g'(r) < 0$ für alle $r \in]1; \infty[$ ist g auf $[1; \infty[$ streng monoton fallend, so daß sich

$$0 = g(0) \leq g(r) \leq g(1) = e^{-1}$$

für alle $r \in \mathbb{R}_0^+$ ergibt.

- Für die Hilfsfunktion

$$h : [0; 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(\varphi) = 3 \cos^2 \varphi - 2,$$

ergibt sich wegen $0 \leq \cos^2 \varphi \leq 1$ dann

$$h\left(\frac{\pi}{2}\right) = -2 \leq h(\varphi) \leq 1 = h(0).$$

Zusammenfassend erhalten wir wegen $f(x, y) = g(r) \cdot h(\varphi)$ demnach

$$-2e^{-1} \leq f(x, y) \leq e^{-1}$$

für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$; dabei ergibt sich für $r = 1$ und $\varphi = \frac{\pi}{2}$, also $(x, y) = (0; 1)$,

$$f(0; 1) = -2e^{-1} \quad \text{und damit} \quad \inf f(\mathbb{R}^2) = \min f(\mathbb{R}^2) = -2e^{-1},$$

sowie für $r = 1$ und $\varphi = 0$, also $(x, y) = (1; 0)$,

$$f(1; 0) = e^{-1} \quad \text{und damit} \quad \sup f(\mathbb{R}^2) = \max f(\mathbb{R}^2) = e^{-1}.$$

b) Die Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)} (x^2 - 2y^2),$$

ist (als Produkt und Komposition von Polynomfunktionen und der Exponentialfunktion) beliebig oft stetig partiell differenzierbar, und für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ gilt

$$\begin{aligned} \partial_1 f(x, y) &= \left(e^{-(x^2+y^2)} \cdot (-2x) \right) \cdot (x^2 - 2y^2) + e^{-(x^2+y^2)} \cdot (2x) = \\ &= -2x e^{-(x^2+y^2)} \cdot (x^2 - 2y^2 - 1) \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} \partial_2 f(x, y) &= \left(e^{-(x^2+y^2)} \cdot (-2y) \right) \cdot (x^2 - 2y^2) + e^{-(x^2+y^2)} \cdot (-4y) = \\ &= -2y e^{-(x^2+y^2)} \cdot (x^2 - 2y^2 + 2). \end{aligned}$$

Als lokale Extrema der Funktion f kommen nur deren kritische Punkte, also diejenigen $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ mit $\text{grad } f(x, y) = (0, 0)$ in Frage. Aus $\partial_1 f(x, y) = 0$ folgt wegen $e^{-(x^2+y^2)} > 0$ schon

$$x = 0 \quad \text{oder} \quad x^2 - 2y^2 - 1 = 0;$$

im Falle $x = 0$ folgt dann aus $\partial_2 f(x, y) = 0$ erneut wegen $e^{-(x^2+y^2)} > 0$ schon $y = 0$ oder $-2y^2 + 2 = 0$ bzw. $y^2 = 1$, also $y \in \{-1, 0, 1\}$, und im Falle $x^2 - 2y^2 - 1 = 0$ ist neben $e^{-(x^2+y^2)} > 0$ auch $x^2 - 2y^2 + 2 = 3 > 0$, so daß aus $\partial_2 f(x, y) = 0$ schon $y = 0$ und damit $x^2 = 1$, also $x \in \{-1, 1\}$ folgt. Damit kommen als lokale Extrema nur die fünf Punkte $(0; 0)$ sowie $(\pm 1; 0)$ und $(0; \pm 1)$ in Frage:

- Wegen $f(\pm 1; 0) = e^{-1}$ nimmt f in den Punkten $(\pm 1; 0)$ gemäß a) das globale Maximum an; insbesondere sind also $(\pm 1; 0)$ lokale Maxima.
- Wegen $f(0; \pm 1) = -2e^{-1}$ nimmt f in den Punkten $(0; \pm 1)$ gemäß a) das globale Minimum an; insbesondere sind also $(0; \pm 1)$ lokale Minima.
- Es ist $f(0; 0) = 0$ sowie

$$f(t; 0) = e^{-t^2} t^2 > 0 \quad \text{für alle } t \neq 0$$

und

$$f(0; t) = e^{-t^2} (-2t^2) < 0 \quad \text{für alle } t \neq 0;$$

dementsprechend nimmt f auf jeder (noch so kleinen) Kreisscheibe um dem Mittelpunkt $(0; 0)$ sowohl positive als auch negative Funktionswerte an und kann daher im Punkt $(0; 0)$ kein lokales Extremum besitzen.

7.41 a) Die gegebene Funktion

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \frac{1}{x} + \frac{x^3}{3} - \frac{1}{y^2} - \frac{y^2}{16},$$

mit

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq 0 \text{ und } y \neq 0\}$$

ist (als gebrochenrationale Funktion) beliebig oft stetig partiell differenzierbar, und für alle $(x, y) \in D$ gilt

$$\partial_1 f(x, y) = -\frac{1}{x^2} + x^2 \quad \text{und} \quad \partial_2 f(x, y) = \frac{2}{y^3} - \frac{y}{8}$$

sowie

$$\partial_1 \partial_1 f(x, y) = \frac{2}{x^3} + 2x \quad \text{und} \quad \partial_2 \partial_2 f(x, y) = -\frac{6}{y^4} - \frac{1}{8}$$

und

$$\partial_2 \partial_1 f(x, y) = 0 = \partial_1 \partial_2 f(x, y),$$

also

$$\text{grad } f(x, y) = \left(-\frac{1}{x^2} + x^2, \frac{2}{y^3} - \frac{y}{8} \right)$$

und

$$\text{Hess } f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{2}{x^3} + 2x & 0 \\ 0 & -\frac{6}{y^4} - \frac{1}{8} \end{pmatrix}.$$

Für eine kritische Stelle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ von f gilt $\text{grad } f(x, y) = (0, 0)$; wegen

$$\partial_1 f(x, y) = 0 \iff x^2 = \frac{1}{x^2} \iff x^4 = 1 \iff x = \pm 1$$

und

$$\partial_2 f(x, y) = 0 \iff \frac{y}{8} = \frac{2}{y^3} \iff y^4 = 16 \iff y = \pm 2$$

kommen als lokale Extrema von f nur die vier Punkte $(1, 2)$ und $(1, -2)$ sowie $(-1, 2)$ und $(-1, -2)$ in Frage:

- Es gilt

$$\text{grad } f(1, \pm 2) = (0, 0) \quad \text{und} \quad \text{Hess } f(1, \pm 2) = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

und wegen $\det(\text{Hess } f(1, \pm 2)) = -2 < 0$ ist $\text{Hess } f(1, \pm 2)$ indefinit; damit besitzt f in $(1, \pm 2)$ Sattelpunkte, also keine lokalen Extrema.

- Es gilt

$$\text{grad } f(-1, \pm 2) = (0, 0) \quad \text{und} \quad \text{Hess } f(-1, \pm 2) = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix};$$

damit besitzt $\text{Hess } f(-1, \pm 2)$ die beiden negativen Eigenwerte -4 und $-\frac{1}{2}$ und ist folglich negativ definit. Daher besitzt f in $(-1, \pm 2)$ (isolierte) lokale Maxima.

Folglich besitzt die Funktion f genau zwei lokale Extrema, nämlich die beiden (isolierten) lokalen Maxima in den Punkten $(-1, \pm 2)$.

- b) Wir betrachten das Verhalten von der Funktion f auf der Winkelhalbierenden $\{(t, t) \mid t \in \mathbb{R}^+\}$ des 1. Quadranten und erhalten

$$f(t, t) = \frac{1}{t} + \frac{t^3}{3} - \frac{1}{t^2} - \frac{t^2}{16} = \underbrace{t^3}_{\rightarrow \infty} \left(\underbrace{\frac{1}{t^4}}_{\rightarrow 0} + \frac{1}{3} - \underbrace{\frac{1}{t^5}}_{\rightarrow 0} - \underbrace{\frac{1}{16t^2}}_{\rightarrow 0} \right) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \infty;$$

damit ist f nicht nach oben beschränkt.

7.42 Die Funktion

$$f :]-1; 1[\times]0; \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = e^x \cos y + e^{-x} \sin y$$

ist als Summe aus Produkten und Quotienten der Exponentialfunktion sowie von trigonometrischen Funktionen selbst beliebig oft stetig partiell differenzierbar, und für alle $(x, y) \in]-1; 1[\times]0; \frac{\pi}{2}[$ gilt

$$\partial_1 f(x, y) = e^x \cos y - e^{-x} \sin y \quad \text{und} \quad \partial_2 f(x, y) = -e^x \sin y + e^{-x} \cos y$$

sowie

$$\partial_1 \partial_1 f(x, y) = e^x \cos y + e^{-x} \sin y \quad \text{und} \quad \partial_2 \partial_2 f(x, y) = -e^x \cos y - e^{-x} \sin y$$

und

$$\partial_1 \partial_2 f(x, y) = -e^x \sin y - e^{-x} \cos y = \partial_2 \partial_1 f(x, y).$$

Für einen kritischen Punkt $(x, y) \in]-1; 1[\times]0; \frac{\pi}{2}[$ von f gilt $\text{grad } f(x, y) = (0, 0)$, also

$$\partial_1 f(x, y) = e^x \cos y - e^{-x} \sin y = 0 \quad \text{und damit} \quad e^x \cos y = e^{-x} \sin y$$

und

$$\partial_2 f(x, y) = -e^x \sin y + e^{-x} \cos y = 0 \quad \text{und damit} \quad e^{-x} \cos y = e^x \sin y;$$

wegen $y \in]0; \frac{\pi}{2}[$ ist $\sin y > 0$ und $\cos y > 0$, und wir erhalten

$$e^{2x} = \frac{e^x \cos y}{e^{-x} \cos y} = \frac{e^{-x} \sin y}{e^x \sin y} = e^{-2x},$$

woraus sich $2x = -2x$, also $x = 0$, und damit $\cos y = \sin y$, also $y = \frac{\pi}{4}$ ergibt. Wegen $\text{grad } f(0, \frac{\pi}{4}) = (0, 0)$ ist $(0, \frac{\pi}{4})$ tatsächlich ein kritischer Punkt von f . Da

$$\text{Hess } f\left(0, \frac{\pi}{4}\right) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{4} & -\sin \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{4} \\ -\sin \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{4} & -\cos \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & -\sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & -\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

wegen $\det \text{Hess } f(0, \frac{\pi}{4}) = -4 < 0$ indefinit ist, besitzt f in $(0, \frac{\pi}{4})$ einen Sattelpunkt; insbesondere ist f ohne lokale Extrema.