

Übungen zur Vorlesung „Lineare Algebra und analytische Geometrie II“

37. (*Staatsexamensaufgabe Frühjahr 2013*). Man betrachte den euklidischen (\mathbb{R}^3, \circ) .

a) Man zeige, daß es genau zwei orthogonale 3×3 -Matrizen der Form

$$S = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 & s_{13} \\ 1 & 2 & s_{23} \\ 2 & s_{32} & s_{33} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

mit geeigneten $s_{13}, s_{23}, s_{32}, s_{33} \in \mathbb{R}$ gibt, und gebe diese beiden Matrizen explizit an.

b) Für welche der beiden in a) ermittelten Matrizen $S \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ beschreibt die lineare Abbildung $\ell_S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \ell_S(x) = S \cdot x$, eine Drehung? (Begründung!). Man bestimme die Drehachse sowie den Cosinus des Drehwinkels.

c) Für welche der beiden in a) ermittelten Matrizen $S \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ beschreibt die lineare Abbildung $\ell_S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \ell_S(x) = S \cdot x$, eine Ebenenspiegelung? (Begründung!). Man bestimme eine Gleichung für die Spiegelungsebene.

38. (*Staatsexamensaufgabe Frühjahr 2008*). Der euklidische \mathbb{R}^3 sei mit den Koordinaten x_1, x_2, x_3 sowie dem Standardskalarprodukt versehen.

a) Man zeige, daß die lineare Abbildung

$$s_1 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, s_1(x) = S_1 \cdot x \quad \text{mit} \quad S_1 = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

eine Spiegelung an einer Ebene $E_1 \subseteq \mathbb{R}^3$ beschreibt, und gebe eine Gleichung für die Ebene E_1 an.

b) Man bestimme eine Matrix $S_2 \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, so daß die lineare Abbildung

$$s_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, s_2(x) = S_2 \cdot x,$$

eine Spiegelung an der Ebene $E_2 : x_1 = x_3$ ist.

c) Für die Komposition $d = s_2 \circ s_1$ der beiden Ebenenspiegelungen aus a) und b) zeige man

$$d(x) = S \cdot x \quad \text{mit} \quad S = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Man begründe, daß d eine Drehung ist, und bestimme die Drehachse sowie den Cosinus des Drehwinkels von d .

39. (*Staatsexamensaufgabe Frühjahr 2011*). Man bestimme die Abbildungsmatrix $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ einer Drehung im euklidischen (\mathbb{R}^3, \circ) mit der Drehachse $\mathbb{R} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ und dem Drehwinkel $\varphi = \frac{\pi}{2}$.

40. (*Staatsexamensaufgabe Frühjahr 2014*). Im euklidischen (\mathbb{R}^3, \circ) betrachte man eine Drehung d mit der Drehachse $\mathbb{R} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ und dem Drehwinkel $\varphi = \frac{\pi}{3}$.

a) Man bestimme eine Orthonormalbasis b_1, b_2, b_3 von (\mathbb{R}^3, \circ) , so daß

$$M = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\sqrt{3} & 0 \\ \frac{1}{2}\sqrt{3} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

die darstellende Matrix von d bezüglich b_1, b_2, b_3 ist.

- b) Man bestimme die darstellende Matrix von d bezüglich der Standardbasis e_1, e_2, e_3 von \mathbb{R}^3 .
- c) Man entscheide, ob d bezüglich einer Basis c_1, c_2, c_3 von \mathbb{R}^3 eine darstellende Matrix in Diagonalgestalt besitzt, und begründe die Entscheidung.

Abgabe bis Mittwoch, den 29. Juni 2016, 10⁰⁰ Uhr (Kästen vor der Bibliothek).