

Tutorium zur Vorlesung „Mathematik im Querschnitt“ — Bearbeitungsvorschlag —

29. a) Die homogene lineare Differentialgleichung

$$(D_0) \quad y'' + 2y' + 2y = 0$$

zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten besitzt das charakteristische Polynom

$$\chi(\lambda) = \lambda^2 + 2\lambda + 2 = (\lambda + 1)^2 + 1 = (\lambda + 1 - i)(\lambda + 1 + i)$$

mit den beiden einfachen Nullstellen $\lambda_1 = -1 + i$ und $\lambda_2 = -1 - i$; damit bilden die beiden Funktionen $\varphi_1, \varphi_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$\varphi_1(x) = e^{-x} \cos x \quad \text{und} \quad \varphi_2(x) = e^{-x} \sin x$$

ein Fundamentalsystem von (D_0) .

b) Die rechte Seite

$$b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad b(x) = -4x^2 - 2,$$

ist von der Form $b(x) = p(x) e^{ax}$ mit der Polynomfunktion $p(x) = -4x^2 - 2$ vom Grade $m = 2$ und $a = 0$. Da a keine Nullstelle von χ ist, wählen wir für die partikuläre Lösung φ_p von

$$(D) \quad y'' + 2y' + 2y = -4x^2 - 2$$

den Ansatz

$$\varphi_p(x) = q(x) = rx^2 + sx + t$$

mit einer Polynomfunktion $q(x) = rx^2 + sx + t$ vom Grade $m = 2$. Wegen

$$\varphi_p'(x) = 2rx + s \quad \text{und} \quad \varphi_p''(x) = 2r$$

ist φ_p genau dann Lösung von (D) , wenn

$$2r + 2(2rx + s) + 2(rx^2 + sx + t) = -4x^2 - 2,$$

also

$$2rx^2 + (4r + 2s)x + (2r + 2s + 2t) = -4x^2 - 2,$$

für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt; durch Koeffizientenvergleich ergibt sich

$$2r = -4, \quad 4r + 2s = 0 \quad \text{und} \quad 2r + 2s + 2t = -2,$$

also $r = -2$, $s = 4$ und $t = -3$, und folglich

$$\varphi_p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi_p(x) = -2x^2 + 4x - 3.$$

30. a) Die homogene lineare Differentialgleichung

$$(D_0) \quad y'' + 4y' + 3y = 0$$

zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten besitzt das charakteristische Polynom

$$\chi(\lambda) = \lambda^2 + 4\lambda + 3 = (\lambda + 1)(\lambda + 3)$$

mit den beiden einfachen Nullstellen $\lambda_1 = -1$ sowie $\lambda_2 = -3$; damit bilden die beiden Funktionen $\varphi_1, \varphi_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$\varphi_1(x) = e^{-x} \quad \text{und} \quad \varphi_2(x) = e^{-3x}$$

ein Fundamentalsystem von (D_0) . Folglich ist die Gesamtheit der Funktionen

$$\varphi = c_1 \cdot \varphi_1 + c_2 \cdot \varphi_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-3x},$$

mit Konstanten $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ die allgemeine Lösung von (D_0) .

b) Die rechte Seite

$$b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad b(x) = 10 \cos x,$$

ist von der Form $b(x) = p(x) e^{ax} \cos(kx)$ mit der Polynomfunktion $p(x) = 10$ vom Grade $m = 0$ sowie $a = 0$ und $k = 1$. Da $a + ki = i$ keine Nullstelle von χ ist, wählen wir für die partikuläre Lösung φ_p der inhomogenen linearen Differentialgleichung

$$(D) \quad y'' + 4y' + 3y = 10 \cos x$$

den Ansatz

$$\varphi_p(x) = q_1(x) \cos x + q_2(x) \sin x$$

mit Polynomfunktionen $q_1(x) = r$ und $q_2(x) = s$ vom Grade $m = 0$. Wegen

$$\varphi_p'(x) = -r \sin x + s \cos x \quad \text{und} \quad \varphi_p''(x) = -r \cos x - s \sin x$$

ist φ_p genau dann Lösung von (D) , wenn

$$(-r \cos x - s \sin x) + 4(-r \sin x + s \cos x) + 3(r \cos x + s \sin x) = 10 \cos x,$$

also

$$(2r + 4s) \cos x + (-4r + 2s) \sin x = 10 \cos x,$$

für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt; damit ergibt sich $2r + 4s = 10$ und $-4r + 2s = 0$, also $r = 1$ und $s = 2$, und folglich $\varphi_p(x) = \cos x + 2 \sin x$.

c) Gemäß a) und b) ist die Gesamtheit der Funktionen

$$\varphi = c_1 \varphi_1 + c_2 \varphi_2 + \varphi_p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-3x} + \cos x + 2 \sin x,$$

mit $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ die allgemeine Lösung von (D) mit

$$\varphi'(x) = -c_1 e^{-x} - 3c_2 e^{-3x} - \sin x + 2 \cos x$$

für alle $x \in \mathbb{R}$; damit ist

$$\varphi(0) = 0 \iff c_1 \cdot 1 + c_2 \cdot 1 + 1 + 2 \cdot 0 = 0 \iff c_1 + c_2 + 1 = 0$$

und

$$\varphi'(0) = 0 \iff -c_1 \cdot 1 - 3c_2 \cdot 1 - 0 + 2 \cdot 1 = 0 \iff -c_1 - 3c_2 + 2 = 0,$$

woraus sich $c_1 = -\frac{5}{2}$ und $c_2 = \frac{3}{2}$ ergibt. Damit ist

$$\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(x) = -\frac{5}{2} e^{-x} + \frac{3}{2} e^{-3x} + \cos x + 2 \sin x,$$

die gesuchte Lösung des gestellten Anfangswertproblems.

31. Die homogene lineare Differentialgleichung

$$(D_0) \quad y'' + 2y' + y = 0$$

zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten besitzt das charakteristische Polynom

$$\chi(\lambda) = \lambda^2 + 2\lambda + 1 = (\lambda + 1)^2$$

mit der doppelten Nullstelle $\lambda = -1$; damit bilden die beiden Funktionen

$$\varphi_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi_1(x) = e^{-x}, \quad \text{und} \quad \varphi_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi_2(x) = x e^{-x},$$

ein Fundamentalsystem von (D_0) . Die gegebene inhomogene lineare Differentialgleichung

$$(D) \quad y'' + 2y' + y = e^{-x}$$

besitzt die rechte Seite

$$b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad b(x) = e^{-x},$$

der Form $b(x) = p(x) e^{ax}$ mit der Polynomfunktion $p(x) = 1$ vom Grade $m = 0$ und der Nullstelle $a = -1$ von χ der Ordnung $\alpha = 2$. Für die partikuläre Lösung φ_p von (D) wählen wir den Ansatz

$$\varphi_p(x) = q(x) e^{-x} = (r x^2 + s x + t) e^{-x}$$

mit einer Polynomfunktion $q(x) = r x^2 + s x + t$ vom Grade $m + \alpha = 2$; nachdem e^{-x} und $x e^{-x}$ die homogene Gleichung (D_0) lösen, können wir $s = t = 0$ wählen. Wegen

$$\varphi_p'(x) = 2r x e^{-x} - r x^2 e^{-x} = (2r x - r x^2) e^{-x}$$

und

$$\varphi_p''(x) = (2r - 2r x) e^{-x} - (2r x - r x^2) e^{-x} = (2r - 4r x + r x^2) e^{-x}$$

ist φ_p genau dann Lösung von (D) , wenn

$$(2r - 4r x + r x^2) e^{-x} + 2(2r x - r x^2) e^{-x} + r x^2 e^{-x} = e^{-x},$$

also

$$2r e^{-x} = e^{-x},$$

für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt; damit ergibt sich $r = \frac{1}{2}$ und folglich $\varphi_p(x) = \frac{1}{2} x^2 e^{-x}$. Damit ist die Gesamtheit der Funktionen

$$\varphi = c_1 \varphi_1 + c_2 \varphi_2 + \varphi_p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(x) = \left(c_1 + c_2 x + \frac{x^2}{2} \right) e^{-x},$$

mit $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ die allgemeine Lösung von (D); dabei ist

$$\varphi'(x) = (c_2 + x) e^{-x} - \left(c_1 + c_2 x + \frac{x^2}{2} \right) e^{-x} = \left((c_2 - c_1) + (1 - c_2) x - \frac{x^2}{2} \right) e^{-x}$$

für alle $x \in \mathbb{R}$. Unter Berücksichtigung der gegebenen Anfangswerte ergibt sich

$$\varphi(0) = 1 \iff c_1 \cdot e^0 = 1 \iff c_1 = 1$$

und damit

$$\varphi'(0) = 1 \iff (c_2 - c_1) \cdot e^0 = 1 \iff c_2 = 1 + c_1 \iff c_2 = 2;$$

folglich ist

$$\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(x) = \left(1 + 2x + \frac{x^2}{2} \right) e^{-x},$$

die maximale Lösung des gegebenen Anfangswertproblems.

32. Die homogene lineare Differentialgleichung

$$(D_0) \quad y'' + 4y = 0$$

zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten besitzt das charakteristische Polynom

$$\chi(\lambda) = \lambda^2 + 4 = (\lambda - 2i)(\lambda + 2i)$$

mit den beiden konjugiert-komplexen Nullstellen $\lambda_{1,2} = \varrho \pm i\sigma$ mit $\varrho = 0$ und $\sigma = 2$; damit bilden die beiden Funktionen

$$\varphi_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi_1(x) = e^{\varrho x} \cos(\sigma x) = \cos(2x),$$

und

$$\varphi_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi_2(x) = e^{\varrho x} \sin(\sigma x) = \sin(2x),$$

ein Fundamentalsystem von (D_0) . Die gegebene inhomogene lineare Differentialgleichung

$$(D) \quad y'' + 4y = \sin(2x)$$

besitzt die rechte Seite

$$b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad b(x) = \sin(2x),$$

der Form $b(x) = p(x) e^{ax} \sin(kx)$ mit der Polynomfunktion $p(x) = 1$ vom Grade $m = 0$ und der Nullstelle $a+ik = 2i$ von χ der Ordnung $\alpha = 1$. Für die partikuläre Lösung φ_p von (D) wählen wir den Ansatz

$$\varphi_p(x) = q_1(x) \cos(2x) + q_2(x) \sin(2x)$$

mit Polynomfunktionen $q_1(x) = r_1 x + s_1$ und $q_2(x) = r_2 x + s_2$ vom Grade $m + \alpha = 1$; nachdem $\cos(2x)$ und $\sin(2x)$ die homogene Gleichung (D₀) lösen, können wir $s_1 = s_2 = 0$ wählen. Wegen

$$\begin{aligned} \varphi_p'(x) &= r_1 (\cos(2x) - 2x \sin(2x)) + r_2 (\sin(2x) + 2x \cos(2x)) \\ &= (r_1 + 2r_2 x) \cos(2x) + (r_2 - 2r_1 x) \sin(2x) \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} \varphi_p''(x) &= (2r_2 \cos(2x) - 2(r_1 + 2r_2 x) \sin(2x)) + \\ &\quad + (-2r_1 \sin(2x) + 2(r_2 - 2r_1 x) \cos(2x)) \\ &= 4(r_2 - r_1 x) \cos(2x) - 4(r_1 + r_2 x) \sin(2x) \end{aligned}$$

ist φ_p genau dann Lösung von (D), wenn

$$4(r_2 - r_1 x) \cos(2x) - 4(r_1 + r_2 x) \sin(2x) + 4(r_1 x \cos(2x) + r_2 x \sin(2x)) = \sin(2x),$$

also

$$4r_2 \cos(2x) - 4r_1 \sin(2x) = \sin(2x),$$

für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt; damit erhält man $r_1 = -\frac{1}{4}$ und $r_2 = 0$, insgesamt also $\varphi_p(x) = -\frac{1}{4}x \cos(2x)$. Damit ist die Gesamtheit der Funktionen

$$\varphi = c_1 \varphi_1 + c_2 \varphi_2 + \varphi_p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(x) = \left(c_1 - \frac{x}{4}\right) \cos(2x) + c_2 \sin(2x),$$

mit $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ die allgemeine Lösung von (D); dabei ist

$$\begin{aligned} \varphi'(x) &= -\frac{1}{4} \cos(2x) - 2 \left(c_1 - \frac{x}{4}\right) \sin(2x) + 2c_2 \cos(2x) \\ &= \left(2c_2 - \frac{1}{4}\right) \cos(2x) - 2 \left(c_1 - \frac{x}{4}\right) \sin(2x) \end{aligned}$$

für alle $x \in \mathbb{R}$. Unter Berücksichtigung der gegebenen Anfangswerte ergibt sich

$$\varphi(0) = 0 \iff c_1 \cos 0 + c_2 \sin 0 = 0 \iff c_1 = 0$$

und

$$\varphi'(0) = 0 \iff \left(2c_2 - \frac{1}{4}\right) \cos 0 - 2c_1 \sin 0 = 0 \iff 2c_2 = \frac{1}{4} \iff c_2 = \frac{1}{8};$$

folglich ist

$$\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(x) = -\frac{x}{4} \cos(2x) + \frac{1}{8} \sin(2x),$$

die maximale Lösung des gegebenen Anfangswertproblems.