Proposition (24.1)

Ist $\tilde{K}$ ein Körper mit Teilkörpern L und M , dann gilt

$$L(M) = M(L).$$

Man bezeichnet $L \cdot M = L(M) = M(L)$ als das **Kompositum** der Körper L und M in $\tilde{K}$. Es handelt sich dabei um den kleinsten Teilkörper von $\tilde{K}$, der $L \cup M$ enthält.

Satz (24.2)

Sei $L|K$ eine endliche Galois-Erweiterung und $M|K$ eine weitere Körpererweiterung mit der Eigenschaft, dass L und M in einem gemeinsamen Erweiterungskörper $\tilde{K}$ enthalten sind. Dann sind auch $L \cdot M|M$ und $L|L \cap M$ Galois-Erweiterungen, und es gibt einen **Isomorphismus**

$$\phi : \text{Gal}(L \cdot M|M) \longrightarrow \text{Gal}(L|L \cap M)$$

von Gruppen mit $\phi(\tau) = \tau|_L$ für alle $\tau \in \text{Gal}(L \cdot M|M)$.

Beweis von Satz 24.2

Vor $L|K$ endliche Galois-Erzw

$M|K$ bel. Körpererw.

Für gem. Erweiterungskörper von L und M

o.B.d.A. ist K alg. abgeschlossen

(1) zeige: $L \cap M$ ist Galois'sch

Dies ist erfüllt, weil $L|K$ Galois'sch und

$L \cap M$ ein Zwischenkörper von $L|K$ ist.

(2) zeige: $L \cdot M | M$ ist Galois'sch

$L|K$ ist endl. und separabel

Satz von prim.
Element

$\exists \alpha \in L$ mit

$L = K(x)$ Seien $x = x_1, \dots, x_r$ die Nullstellen von $f = \mu_{x, K}$
in L . $L|K$ normal $\Rightarrow x_1, \dots, x_r \in L$

Beh. $LM = M(x_1, \dots, x_r)$ „ $\supseteq$ “ klar, da $x_1, \dots, x_r \in L$

„ $\subseteq$ “ z.zg. $M(L) \subseteq M(x_1, \dots, x_r)$ genügt: $L \subseteq M(x_1, \dots, x_r)$

Das ist wegen $L = K(x_1, \dots, x_r)$ ebenfalls offensichtlich.

Da x separabel über K ist ($L|K$ ist gal.), ist $f \in K[x]$ ein
separables Polynom. $\mu_{x_i, M}$ ist Teiler von $\mu_{x, K} = f$ in $M[x]$

($1 \leq i \leq r$) $\Rightarrow \mu_{x_i, M}$ separabel ($1 \leq i \leq r$) $\Rightarrow x_i$ separabel über

M ($1 \leq i \leq r$) Also ist $M(x_1, \dots, x_r)$ eine separable Erweiterung.

Außerdem ist $LM \stackrel{(*)}{=} M(x_1, \dots, x_r)$ Zerf. kop. von f über M . $\Rightarrow$

$LM|M$ ist normal insgesamt; $LM|M$ ist galois'sch
(wegen $(*)$ darüber hinaus endlich)

(3) Zeige: Durch $\tau \mapsto \tau|_L$ ist ein Gruppenhom
 $\text{Gal}(LM|M) \rightarrow \text{Gal}(L|L \cap M)$ definiert (*)

Sei $\tau \in \text{Gal}(LM|M)$, $\tau \in \text{Aut}(LM)$

$\Rightarrow \tau|_L$ ist Körperhom $L \rightarrow \tilde{K}$,

wegen $M \supseteq L \cap M$, $\tau(\alpha) = \alpha \forall \alpha \in M$ darüber hinaus
ein $L \cap M$ -Hom., d.h. $\tau|_L \in \text{Hom}_{L \cap M}(L, \tilde{K})$

Teil (1) $\Rightarrow L|L \cap M$ ist normal $\Rightarrow$

$\tau|_L \in \text{Aut}_{L \cap M}(L)$, d.h. $\tau|_L \in \text{Gal}(L|L \cap M)$

Bezeichne die Abb. (*) mit ϕ . Die Hom-eig.
ist leicht zu überprüfen (vgl. § 22)

(4) zeige: ϕ ist injektiv

Sei $\tau \in \ker(\phi) \Rightarrow \tau|_L = \phi(\tau) = \text{id}_L$

τ ist M -Automorphismus $\rightarrow \tau|_M = \text{id}_M$

$\Rightarrow L, M \subseteq (L \cdot M)^{\langle \tau \rangle} \Rightarrow L \cdot M = L(M) \subseteq (L \cdot M)^{\langle \tau \rangle}$

$\Rightarrow \tau = \text{id}_{L \cdot M}$

(5) zeige: ϕ ist surjektiv

Sei $G = \text{Gal}(L \cdot M | M)$ zeig: $\phi(G) =$

$\text{Gal}(L | L \cap M)$ Nach dem Hauptsatz der Galois-Theorie

ist dies äquivalent zu $L^{\phi(G)} = L \cap M$. „ $\supseteq$ “ ist

klar, weil $L^{\phi(G)}$ als Fixkörper einer Untergruppe von

$\text{Gal}(L | L \cdot M)$ ein Zwischenkörper von $L | L \cap M$ ist.

" $\Leftarrow$ " Sei $\alpha \in L^{\phi(G)}$. $\Rightarrow \phi(\tau)(\alpha) = \alpha \quad \forall \tau \in G$

$\Rightarrow (\tau|_L)(\alpha) = \alpha \quad \forall \tau \in G \Rightarrow \tau(\alpha) = \alpha \quad \forall \tau \in G$

wobei $G = \text{Gal}(LM|M)$. Also liegt α im Fixkörper
 $(LM)^G$ von G . Laut Hauptsatz der Galois-Theorie ist
 $(LM)^G = M \Rightarrow \alpha \in M$, w.z.z. $\alpha \in L \cap M$. $\square$

(LM)
- eig

Definition (24.3)

Eine **Radikalerweiterung** ist eine endliche Körpererweiterung $L|K$ mit folgenden Eigenschaften: Es gibt ein $r \in \mathbb{N}_0$, eine Kette von Zwischenkörpern

$$K = L_0 \subseteq L_1 \subseteq \dots \subseteq L_r = L ,$$

natürliche Zahlen $n_1, \dots, n_r$ und für $1 \leq i \leq r$ Elemente $\gamma_i \in L_i$, so dass jeweils $L_i = L_{i-1}(\gamma_i)$ und $\gamma_i^{n_i} \in L_{i-1}$ erfüllt ist.

Beispiel. Das Element $\alpha = \sqrt[3]{\sqrt{2+\sqrt{5}} + \sqrt{7}} \in \mathbb{R}$
ist in einer Radikalerweiterung von $\mathbb{Q}$ enthalten.

Setze $L_0 = \mathbb{Q}$

Setze $\gamma_1 = \sqrt{5}$, $n_1 = 2$, $L_1 = L_0(\gamma_1)$

Setze $\gamma_2 = \sqrt{7}$, $n_2 = 2$, $L_2 = L_1(\gamma_2)$

Setze $\gamma_3 = \sqrt{2+\sqrt{5}}$, $n_3 = 2$, $L_3 = L_2(\gamma_3)$

Setze $\gamma_4 = \sqrt[3]{\gamma_3 + \gamma_2}$, $n_4 = 3$, $L_4 = L_3(\gamma_4)$

Dann zeigt die Kette

$\mathbb{Q} = L_0 \subseteq L_1 \subseteq L_2 \subseteq L_3 \subseteq L_4$, dass $L_4 / \mathbb{Q}$
eine Radikalerweiterung mit $\alpha = \gamma_4 \in L_4$ ist.

L.M.)¹⁷

Theorie

" ist

ppd von

n.M. 4

Definition (24.4)

Man sagt, ein nicht-konstantes Polynom $f \in K[x]$ ist **durch Radikale auflösbar**, wenn eine Radikalerweiterung $L|K$ existiert, so dass f über L in Linearfaktoren zerfällt.

Satz (24.5)

Sei $f \in K[x]$ ein nicht-konstantes Polynom mit **auflösbarer** Galoisgruppe $G = \text{Gal}(f|K)$. Dann ist f durch Radikale auflösbar.

Beweis von Satz 24.5

geg. $f \in K[x]$, K Körper des Charakteristik 0

Vor. f hat eine auflösbare Galoisgruppe G

z.z. f ist durch Radikale auflösbar

Sei L ein Zerfällungskörper von f über K , so dass

$G = \text{Gal}(L|K)$ ist. G ist auflösbar $\Rightarrow$

$\exists$ Kette von Untergr. $G = U_0 \supseteq U_1 \supseteq \dots \supseteq U_r = \text{id}_G$

so dass $U_i \trianglelefteq U_{i-1}$ und U_{i-1}/U_i zyklisch für

$1 \leq i \leq r$. Sei $n_i = (U_{i-1} : U_i)$ für $1 \leq i \leq r$.

→ Kette von Untergro. $G = U_0 \supseteq U_1 \supseteq \dots \supseteq U_r = \text{triv}$
so dass $U_i \trianglelefteq U_{i-1}$ und U_{i-1}/U_i zyklisch für

Setze $L_i = L^{U_i}$ für $0 \leq i \leq r$. Galoistheorie $\Rightarrow$

$K = L_0 \subseteq L_1 \subseteq \dots \subseteq L_r = L$. Für $0 \leq i \leq r$ gilt

jeweils $U_i = \text{Gal}(L|L_i)$, außerdem: $U_i = \text{Gal}(L|L_i)$

ist Normalteiler von $U_{i-1} = \text{Gal}(L|L_{i-1})$. Galoistheorie

$\Rightarrow L|L_{i-1}$ ist normale Teilerweiterung von $L|L_{i-1}$, und

$\text{Gal}(L_i|L_{i-1}) = \text{Gal}(U_{i-1}/U_i) = U_{i-1}/U_i$ ($1 \leq i \leq r$)

Um das Ergebnis aus §23 anwenden zu können, definiere

$n = \text{kgV}(n_1, \dots, n_r)$ und wähle in einem alg. Abschluss $\bar{L}$ von L

eine primitive n -te Einheitswurzel ζ . Setze $K' = K(\zeta)$,

$L' = L(\zeta)$ und $L_i' = L_i(\zeta)$ für $0 \leq i \leq r$. Die Erweiterung

$L_i'|L_{i-1}'$ erfüllt dann die Voraussetzungen der Sätze aus §23,

dann: Sei $m_i = [L_i' : L_{i-1}]$ Es
 gilt $L_i' = L_i \cdot K' = L_i \cdot K(S)$ Nach
 dem Verschlingungssatz der Galoistheorie
 gilt $\text{Gal}(L_i' | L_{i-1}) \cong \text{Gal}(L_i | K' \cap L_i)$.
 $\Rightarrow \text{Gal}(L_i' | L_{i-1})$ ist damit isomorph zu
 einer Untergr. der zyklischen Gruppe
 $\text{Gal}(L_i | L_{i-1})$ und somit ebenfalls zyklisch,
 und $m_i | n_i$. Da L_{i-1} eine primitive n -te
 Einheitswurzel S enthält, enthält sie mit
 S^{n/m_i} auch eine prim. m_i -te Einheitswurzel.

§23 $\rightarrow \exists \gamma_i \in L_i'$ mit $L_i' = L_{i-1}'(\gamma_i)$

und $\gamma_i^{m_i} \in L_{i-1}'$. Die Körperkette

$$K \subseteq K' = K(\beta) = L_0' \subseteq L_1' \subseteq \dots \subseteq L_r' = L'$$

zeigt, dass $L' | K$ eine Radikalerweiterung ist.

Weil f über L in Linearfaktoren zerfällt, zerfällt
 f erst recht über $L' \Rightarrow f$ ist durch Radikale
auflösbar. $\square$

Lemma (24.6)

Seien $L_1|K$ und $L_2|K$ zwei normale Erweiterungen desselben Körpers K .

- Dann ist auch die Erweiterung $L_1 \cap L_2|K$ normal.
- Sind L_1 und L_2 in einem gemeinsamen Erweiterungskörper M enthalten, dann ist auch $L_1 \cdot L_2|K$ eine normale Erweiterung, wobei $L_1 \cdot L_2$ das **Kompositum** von L_1 und L_2 in M bezeichnet.

Proposition (24.7)

- (i) Sei $L|K$ eine Radikalerweiterung, $\tilde{K}$ ein algebraischer Abschluss von K und $\sigma : L \rightarrow \tilde{K}$ ein K -Homomorphismus. Dann ist auch $\sigma(L)|K$ eine Radikalerweiterung.
- (ii) Ein Kompositum zweier Radikalerweiterungen ist eine Radikalerweiterung.
- (iii) Ist $L|K$ eine separable Radikalerweiterung, so gibt es einen Erweiterungskörper M von L mit der Eigenschaft, dass $M|K$ eine **Galois-Erweiterung** und zugleich eine **Radikalerweiterung** ist.

Beweis von Prop. 24.7

zu i) geg. Radikalerw. $L|K$, $\tilde{K} \supseteq L$ alg. abg. abg.
Erweiterungskörper, $\sigma \in \text{Hom}_K(L, \tilde{K})$

z.zg. $\sigma(L)|K$ ist Radikalerw.

$L|K$ Radikalerw. $\Rightarrow$ $\exists$ Kette von Zwischenkorp.

$K = L_0 \subseteq L_1 \subseteq \dots \subseteq L_{r-1} \subseteq L_r = L$ und

$n_1, \dots, n_r \in \mathbb{N}$, $\gamma_i \in L_i$ mit $L_i = L_{i-1}(\gamma_i)$,

$\gamma_i^{n_i} \in L_{i-1}$ für $1 \leq i \leq r$ Wende σ auf die

Kette an, erhalte

$$\sigma(K) = K \subseteq \sigma(L_1) \subseteq \dots \subseteq \sigma(L_{r-1}) \subseteq$$

$\sigma(L_i) = \sigma(L)$ für $1 \leq i \leq r$ gilt jeweils
 $\sigma(\gamma_i)^{n_i} = \sigma(\gamma_i^{n_i}) \in \sigma(L_{i-1})$ und

$$\sigma(L_{i-1})(\sigma(\gamma_i)) = \sigma(L_{i-1}(\gamma_i)) = \sigma(L_i)$$

Dies zeigt, dass $\sigma(L) | K$ eine Radikalerw. ist.

zu (ii) Seien $L | K, M | K$ Radikalerw., wobei
 L und M Teilkörper eines Körpers K sind
z.zgf. $L \cdot M | K$ ist Radikalerw.

Vor $\rightarrow$ 2 Körperketten $K = L_0 \subseteq L_1 \subseteq \dots \subseteq L_r = L$
und $K = M_0 \subseteq M_1 \subseteq \dots \subseteq M_s = M, m_1, \dots, m_r,$
 $n_1, \dots, n_s \in \mathbb{N}, \gamma_i \in L_i, \delta_j \in M_j$ mit
 $\gamma_i^{n_i} \in L_{i-1}, L_i = L_{i-1}(\gamma_i)$ für $1 \leq i \leq r$ und
 $\delta_j^{m_j} \in M_{j-1}, M_j = M_{j-1}(\delta_j)$ für $1 \leq j \leq s$.

⇒ erhalte eine neue Körperkette

$$L = M_0' \subseteq M_1' \subseteq \dots \subseteq M_s' = L \cdot M \text{ durch}$$

$$M_j' = L \cdot M_j \text{ für } 0 \leq j \leq s. \text{ leicht zu überprüfen:}$$

$$M_j' = M_{j-1}'(\delta_j), \delta_j^{n_j} \in M_{j-1}' \text{ für } 1 \leq j \leq s.$$

zuliii) Sei $L|K$ eine sep. Radikalext. z.zg. $\exists$ Radikalext. -
terung $M|K$ mit $M \supseteq L$, die außerdem galois'sch ist

$L|K$ endl. sep. Ext. $\xrightarrow[\text{Element}]{\text{Satz von prism}}$ $\exists \alpha \in L$ mit $L = K(\alpha)$

Sei $f = \text{Min.}_K$ und M ein Zerfällungskörper von f über K
mit $M \supseteq L$. Dann ist $M|K$ eine Galois-Ext.

Element

Sei $f = \text{Min. P.}$ und M ein Zerfällungskörper von f über K .

Seien $\alpha = \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ die Nullstellen von f in M .

$\Rightarrow M = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, nach Def. des Zerfällungskörpers.

Fortsetzungssatz $\rightarrow \exists \sigma_i \in \text{Hom}_K(K(\alpha), M)$ mit $\sigma_i(\alpha) = \alpha_i$.

Dieser liefert einen Isom. zwischen $K(\alpha)$ und $K(\alpha_i) | K$, d.h.

$K(\alpha_i) = \sigma_i(K(\alpha))$ $L = K(\alpha) \Rightarrow K(\alpha) | K$ ist Radikalerw.

i) $K(\alpha_i) | K$ ist Radikalerw.

leicht zu sehen: $M = K(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ ist Komposition von

$K(\alpha_1), \dots, K(\alpha_r)$ iii) $M | K$ ist Radikalerw. $\square$